

この説明文書は、本剤を服用する前に必ずよくお読みください。
また、必要なときに読めるよう大切に保管してください。

第3類医薬品

肩こり・腰痛・五十肩・神経痛
眼精疲労などの緩和に

コンドロイチン配合
リズミカルDA
ビタミンB₁主薬製剤

特 徴

1. 本剤は、神経や筋肉の機能維持に必要なビタミンB₁に、糖質、脂質、アミノ酸・蛋白質等の生体内代謝に広く関与するビタミンB₂・B₆及び滋養強壮作用のあるものとして知られているニンニクの抽出成分を配合しています。
2. これに軟骨、皮ふ、眼の成分であるコンドロイチン硫酸エステルナトリウムを加えることにより、不快な関節痛（肩こり、腰痛、五十肩）や神経痛、手足のしびれ、眼精疲労などの改善や肉体疲労時、妊娠・授乳期、病中病後の体力低下時に役立ちます。



使用上の注意

相談すること

1. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消 化 器	吐き気・嘔吐、食欲不振、胃部不快感、胃部膨満感

2. 服用後、次の症状があらわれることがありますので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

軟便、下痢

3. 1ヶ月位服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

効能又は効果

- 次の諸症状の緩和：神経痛、筋肉痛・関節痛（腰痛、肩こり、五十肩など）、手足のしびれ、便秘、眼精疲労
- 脚気
「ただし、これらの症状について、1カ月ほど服用しても改善がみられない場合は、医師又は薬剤師に相談してください。」
- 次の場合のビタミンB₁の補給：肉体疲労時、妊娠・授乳期、病中病後の体力低下時

用法及び用量

次の1回量をなるべく空腹時をさけて、水又は白湯で服用してください。

年齢	1回量	1日服用回数
成人(15歳以上)	2カプセル	1～3回 (2回服用する場合は、朝・夕に服用してください 3回服用する場合は、朝・昼・夕に服用してください)
15歳未満の小児		服用しないでください

〈用法及び用量に関連する注意〉

定められた用法及び用量をお守りください。

成分及び分量

成分	分量 (6カプセル中)	作用
コンドロイチン硫酸エステルナトリウム	900mg	神経・腰・関節の痛み、肩こりや目の疲れをやわらげます
ベンフォチアミン (ビタミンB ₁ 誘導体)	100mg	神経や筋肉の機能維持に働きます
リボフラビン酪酸エステル (ビタミンB ₂ 酪酸エステル)	12mg	糖質・脂質・蛋白質等の生体内代謝に広く関与します
ピリドキシン塩酸塩 (ビタミンB ₆)	50mg	アミノ酸・蛋白質の分解・生合成や、脂肪の代謝に関与します
加工大蒜 (ニンニク6gに相当)	60mg	滋養強壮作用

*添加物として、バレイシヨデンプン、乳糖水和物、ラウリル硫酸Na、ゼラチンを含有します。

*本剤の服用により尿が黄色くなることがありますが、これは本剤に含まれるビタミンB₂（リボフラビン酪酸エステル）によるもので、心配はありません。

保管及び取扱い上の注意

- (1) 服用後は、必ずキャップを十分に閉めてもとの箱に入れ、直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2) 小児の手のとどかない所に保管してください。
- (3) 誤用をさけ、品質を保持するため、他の容器に入れかえないでください。
- (4) 水分がカプセルに付きますと内容成分の変質の原因となりますので、誤って水滴を落としたり、ぬれた手で触れないでください。
- (5) 使用期限（外箱及び容器に記載）を過ぎた製品は服用しないでください。

消費者相談窓口

製品についてのお問い合わせは、お求めのお店又はノーエチ薬品(株)

TEL 072-331-0417

[電話受付時間：月～金(祝日・年末年始を除く)9:00～17:00]へお願い致します。

副作用被害救済制度の問合せ先
(独) 医薬品医療機器総合機構
<http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai.html>
電話 0120-149-931 (フリーダイヤル)

発売元

ノーエチ薬品株式会社
大阪府松原市高見の里4丁目8番16号

製造販売元

ジャパンメディック株式会社
富山県富山市横越168