

ご使用に際して、この説明文書を必ずお読みください。  
また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

第3類医薬品

## ビタミンB<sub>2</sub>主薬製剤

# ビタレオン<sup>®</sup> B2

ビタレオン B2 は、肌あれ・にきびや口内炎等の皮膚や粘膜の症状改善に効果のあるビタミン剤です。  
「お肌のビタミン」とも呼ばれる持続型ビタミン B<sub>2</sub>に、コラーゲン生成に不可欠なビタミン C と古くから肌あれに効果をあらわす生薬として使用されているヨクイニンのエキスを配合しています。  
スッと溶けるのみやすい顆粒剤です。

### ⚠ 使用上の注意

#### 相談すること



1. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性がありますので、直ちに服用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症 状
消化器	胃部不快感、胃部膨満感、食欲不振、吐き気・嘔吐

2. 服用後、次の症状があらわれることがありますので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください  
下痢  
3. 1ヵ月位服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

### 効能・効果

- 次の諸症状の緩和：口角炎、口唇炎、口内炎、舌炎、湿疹、皮膚炎、かぶれ、ただれ、にきび、肌あれ、赤鼻、目の充血、目のかゆみ  
「ただし、これらの症状について、1ヵ月ほど使用しても改善がみられない場合は、医師又は薬剤師に相談してください。」
- 次の場合のビタミン B<sub>2</sub> の補給：肉体疲労時、妊娠・授乳期、病中病後の体力低下時

### 用法・用量

次の量を食後に服用してください。

ただし、1日2回服用する場合は朝晩、1日3回服用する場合は朝昼晩服用してください。

年 齢	1 回量	1 日服用回数
大人(15歳以上)	1 包	
11~14歳	2/3 包	2 回(朝晩)
7~10歳	1/2 包	1
3~6 歳	1/3 包	3 回(朝昼晩)
3 歳未満	服用しないでください	

#### 〈用法・用量に関する注意〉

- (1) 用法・用量を厳守してください。  
(2) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。

### 成分・分量

3包中

成 分	含 有
リボフラビン 酯酸エステル (ビタミン B <sub>2</sub> 酯酸エステル)	20 mg
ヨクイニンエキス (原生薬として)	769.2 mg 10 g)
アスコルビン酸 (ビタミン C)	500 mg

添加物：D-マンニトール、ポビドン、スクラロース、キシリトール、二酸化ケイ素、香料

#### 〈成分・分量に関する注意〉

本剤の服用により尿が黄色くなることがあります、これは本剤に含まれるリボフラビン 酯酸エステル (ビタミン B<sub>2</sub> 酯酸エステル) によるものです。

### 保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。  
(2) 小児の手の届かない所に保管してください。  
(3) 他の容器に入れ替えないでください（誤用の原因になったり品質が変わります。）。  
(4) 1包を分割した残りを服用する場合には、袋の口を折り返して保管し、2日以内に服用してください。  
(5) 配置期限を過ぎた製品は服用しないでください。

### お問い合わせ先

- 1) 本製品の購入先
- 2) 佐藤薬品工業株式会社 医薬情報部  
TEL 0744-28-0021  
受付時間 9:00~16:30 (土・日・祝日を除く)

®：登録商標