

Chocola[®] BB

病中病後の
体力低下時、
口内炎、湿疹、
疲れに

ビタミンB₂主薬製剤

チョコラBB[®] こども シロップ

第3類医薬品

生後3か月から服用できます
(生後3か月～15歳未満)

3か月以上1歳未満



5mL



1歳以上7歳未満



7.5mL



7歳以上15歳未満



15mL



ピーチ風味

1日2回服用



■1瓶(30mL)中の成分

リボフラビンリン酸エステルナトリウム(ビタミンB₂リン酸エステル)
..... 19mg

ピリドキシン塩酸塩
(ビタミンB₆)..... 12mg

チアミン硝酸塩
(ビタミンB₁硝酸塩)..... 6mg

ニコチン酸アミド..... 20mg

ビオチン..... 250μg

添加物として、安息香酸Na、エタノール(0.1mL以下)、クエン酸、クエン酸Na、D-ソルビトール、パラベン、香料、還元麦芽糖水アメ、グリシン、没食子酸プロピル、ポビドン、DL-リンゴ酸、pH調整剤○本剤の服用により、尿が黄色くなる場合がありますが、これは本剤に含まれているビタミンB₂が吸収され、その一部が尿中に排泄されるためで心配はありません。

■保管及び取扱い上の注意

(1)直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください。(2)小児の手の届かない所に保管してください。(3)開封後は冷蔵庫などに保管し、お早めに服用してください。(4)他の容器に入れ替えないでください。また、本容器内に他の薬剤等を入れないでください。(誤用の原因になったり品質が変わります。)(5)服用後は、計量容器を水洗いし、お薬と一緒にして大切に保管してください。(6)使用期限をすぎた製品は使用しないでください。

副作用被害救済制度の問合せ先

(独)医薬品医療機器総合機構

http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai_camp/index.html

電話 0120-149-931(フリーダイヤル)

もも由来の原料は
使用していません

押して開けて
ください

ご使用に際して、この箱の説明文を必ずお読みください。また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

⚠ 使用上の注意



相談すること

- ① 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください [皮膚] 発疹 [消化器] 胃部不快感
- ② 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください 下痢
- ③ 1ヵ月位服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

■ 効能・効果

次の諸症状の緩和: 肌あれ、かぶれ、ただれ、にきび、湿疹、皮膚炎、口内炎、口角炎、口唇炎、舌炎、赤鼻、目の充血、目のかゆみ 「ただし、これらの症状について、1ヵ月ほど使用しても改善がみられない場合は、医師又は薬剤師に相談すること。」 次の場合のビタミンB₂の補給: 肉体疲労時、病中病後の体力低下時

■ 用法・用量

1日2回、添付の計量容器で下記の分量を量り、**食後**に服用してください。

年齢	1回量	服用回数
7歳以上15歳未満 	 1回 15 mL	1日2回
1歳以上7歳未満 	 1回 7.5 mL	
3ヵ月以上1歳未満 	 1回 5 mL	
3ヵ月未満	×服用しないこと	

小児(3ヶ月以上15歳未満)に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。

製造 第一薬品工業株式会社
販売元 富山県富山市草島15-1

発売元 **エーザイ株式会社**
東京都文京区小石川4-6-10

本品に関するお問い合わせは、エーザイ「hhc ホットライン」へ **0120-161-454**

計量
容器付



製品の
情報は
こちら
から▶



eisai.jp