

お問い合わせ先:エーザイ
0120-161-454

ノンカフェイン

1びん
1.2kcal

糖類
0

Chocolate
BB[®]
Drink

bit

Eisai



eisai.jp

(服用は15歳以上)

チョコラ
バイバー

にきび、
肌あれに

ビタミンB2・B6
ヨクイニン

チョコラBB[®]
ドリンクビット

製造販売元

第一薬品工業株式会社
富山県富山市草島15-1

発売元

エーザイ株式会社
東京都文京区小石川4-6-10

第3類医薬品

■使用上の注意 相談すること ①服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください 皮膚:発疹 消化器:胃部不快感 ②服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください 下痢 ③1ヵ月位服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください ■効能・効果 次の諸症状の緩和:肌あれ、にきび・吹き出物、口内炎、口角炎(唇の両端の腫れ・ひび割れ)、口唇炎(唇の腫れ・ひび割れ)、皮膚炎、湿疹、かぶれ、ただれ、舌の炎症、赤ら顔に伴う顔のほてり、目の充血、目のかゆみ 「ただし、これらの症状について、1ヵ月ほど使用しても改善がみられない場合は、医師又は薬剤師に相談すること。」 次の場合のビタミンB2の補給:肉体疲労時、妊娠・授乳期、病中病後の体力低下時 ■用法・用量 成人(15歳以上)は、1日1回1瓶(50mL)を服用してください。〇小児(15歳未満)には服用させないでください。 ■1瓶(50mL)中の成分 ビタミンB2リン酸エステル20mg、ビタミンB6 25mg、ビタミンB1硝酸塩5mg、ニコチン酸アミド30mg、ヨクイニンエキス100mg(ヨクイニンとして1300mg) 添加物として、安息香酸Na、エタノール(0.1mL以下)、クエン酸、クエン酸Na、バニリン、パラベン、プロピレングリコール、香料、アセスルファムK、エリスリトール、スクラロース、没食子酸プロピル、DL-リンゴ酸 〇本剤は生薬エキスを配合しているため、濁りを生じることがありますが、効果には変わりありません。〇本剤の服用により、尿が黄色くなることはありますが、これは本剤に含まれているビタミンB2が吸収され、その一部が尿中に排泄されるため心配はありません。 ■保管及び取扱い上の注意 (1)直射日光の当たらない涼しい所に保管してください。(2)小児の手の届かない所に保管してください。(3)他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わります。)(4)使用期限をすぎた製品は使用しないでください。

SG-3

副作用救済制度
0120-149-931