

第3類医薬品

服用に際して、この説明文書を必ずお読みください。
又、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

新アリナプロンBB

⚠ 使用上の注意



相談すること

1ヵ月位服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

《効能又は効果》

次の諸症状の緩和：肌あれ、にきび、口内炎、口角炎、口唇炎、舌炎、湿疹、皮膚炎、かぶれ、ただれ、赤鼻、目の充血、目のかゆみ

「ただし、これらの症状について、1ヵ月ほど使用しても改善がみられない場合は、医師又は薬剤師に相談すること。」

次の場合のビタミンB₂の補給：肉体疲労時、妊娠・授乳期、病中病後の体力低下時

《成分及び分量》 1日量（2錠）中

チアミン硝化物（ビタミンB ₁ 硝酸塩）	20mg
リボフラビン（ビタミンB ₂ ）	30mg
ピリドキシン塩酸塩（ビタミンB ₆ ）	24mg
アスコルビン酸カルシウム	125mg
（アスコルビン酸（ビタミンC）として103mg）	
ニコチン酸アミド	40mg
パントテン酸カルシウム	20mg
添加物として、乳酸Ca、トウモロコシデンプン、無水ケイ酸、ヒドロキシプロピルセルロース、dl- α -トコフェロール、ステアリン酸Mg、セルロース、ヒプロメロース、マクロゴール、酸化チタン、黄色5号、カルナウバロウを含有する。	

〈成分・分量に関連する注意〉

- (1)本剤の服用により尿が黄色くなる場合がありますが、これは本剤に含まれるビタミンB₂によるもので心配ありません。
- (2)ビタミンCの服用により尿及び大便の検査値に影響を与えることがあります。医師の治療を受ける場合は、本剤を服用していることを医師にお知らせください。

《用法及び用量》

次の量を1日2回朝夕食後に、水又は白湯にて服用してください。

年 齢	1回量	1日服用回数
大人（15歳以上）	1錠	2回
15歳未満	服用しないこと	

〈用法・用量に関連する注意〉

用法・用量を厳守してください。

《保管及び取扱い上の注意》

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。（誤用の原因になったり品質が変わる。）
- (4) ぬれた手で本剤に触れないでください。又、手にとった錠剤を元の容器に戻しますと、他の錠剤に影響を与えますので注意してください。
- (5) 使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。

本製品についてのお問い合わせは下記にお願い申し上げます。
大峰堂薬品工業株式会社 「消費者相談窓口」
〒635-0051 奈良県大和高田市根成柿574
電話 (0745) 22-3601(代)
受付時間 9:00~17:00 (土、日、祝日を除く)

製造販売元

大峰堂薬品工業株式会社

奈良県大和高田市根成柿574