



30mL×3

製造番号

使用期限

病中病後の体力低下時のビタミンB<sub>2</sub>補給に

小児用 **ママポポ** 内服液 第3類  
医薬品

P-81A-61

アルコール・カフェイン・白糖は含まれておりません。

病中病後の体力低下時のビタミンB<sub>2</sub>補給に

アルコール・カフェイン・白糖は含まれておりません。

OPEN ↓

〈成分・分量〉

1日量(2本・60mL)中

ピオチン(V.H)……………250μg  
チアミン塩化物塩酸塩(V.B1)……6mg  
リボフラビンリン酸エステル

ナトリウム(V.B2)……16mg  
ピリドキシン塩酸塩(V.B6)……20mg  
ニコチン酸アミド……………20mg  
添加物として、キシリトール、スクラロース、DL-リンゴ酸、クエン酸水和物、グリシン、安息香酸ナトリウム、香料を含有します。

〈成分・分量に関連する注意〉  
●本剤の服用により、尿が黄色になることがあります。本剤中のリボフラビン(V.B2)によるもので心配ありません。

甘味料はキシリトール・スクラロースのみを使用しております。



こども用ビタミンB<sub>2</sub>主薬ドリンク



30mL×3

第3類医薬品

〈効能・効果〉

次の諸症状の緩和：口角炎、口唇炎、口内炎、舌炎、湿疹、皮膚炎、かぶれ、ただれ、にきび、肌あれ、赤鼻、目の充血、目のかゆみ  
〔ただし、これらの症状について、1ヵ月ほど使用しても改善が見られない場合は、医師又は薬剤師に相談すること。〕  
次の場合のビタミンB<sub>2</sub>の補給：肉体的疲労時、病中病後の体力低下時

〈用法・用量〉

年齢	1回量	1日服用回数
7歳以上 15歳未満	1本	1～2回 ただし、2回服用する場合は、約4時間の間隔をおいて服用してください。
3歳以上 7歳未満		1回
3歳未満 の乳幼児		服用しないでください。

〈用法・用量に関連する注意〉  
●用法・用量を厳守してください。  
●小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。

小児用 **ママポポ** 内服液 第3類医薬品

こども用ビタミンB<sub>2</sub>主薬ドリンク「小児用ママポポ内服液」 第3類医薬品

⚠ 使用上の注意

🗨️ 相談すること

1ヵ月位服用しても症状がよくなりえない場合は服用を中止し、この外箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください



保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない涼しい所に保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。



製造販売元

**合名会社 東宝製薬**  
岐阜市沖ノ橋町3丁目45番地  
お客様相談窓口 TEL 058-251-6668  
〔月～金曜日10:00～16:00(祝日を除く)〕  
副作用被害救済制度 ☎0120-149-931

