

肌あれ・にきび・口内炎に  
販売名  
**マスチゲン®BBチュアブル錠**  
水なしでポリポリとかんで服用



第3類医薬品  
12錠入  
服用は1日1回

ビタミンC・ビタミンB<sub>2</sub>・ビタミンB<sub>6</sub>配合の、肌あれ・にきび・口内炎に効く、水なしでポリポリとかんで服用する医薬品のチュアブル錠です。

**特長**

1. チュアブル錠は、水なしでポリポリとかんで服用できますので、職場や学校で手軽に症状の改善効果を得られます。
2. お肌の真皮層を形成するコラーゲンづくりを助けるビタミンC配合により肌あれを内側から治します。
3. 皮膚を正常な状態にもどすビタミンB<sub>6</sub>配合により、ポツポツと赤くはれたニキビを体の中から治します。
4. ビタミンB<sub>6</sub>の働きで、しみると痛い口内炎を改善します。
5. 疲れの栄養補給に効果的です。
6. 低カロリー・甘さひかえめ。
7. 外出時に携帯しやすい6錠入シート包装。


**効能・効果** 次の諸症状の緩和：**肌あれ、にきび**・吹き出物、**口内炎**、口角炎(唇の両端の腫れ・ひび割れ)、口唇炎(唇の腫れ・ひび割れ)、湿疹、皮膚炎、かぶれ、ただれ、赤ら顔に伴

う顔のほてり、舌の炎症、目の充血、目のかゆみ  
[ただし、これらの症状について、1ヵ月ほど使用しても改善がみられない場合は、医師又は薬剤師に相談すること。]

**次の場合のビタミンB<sub>2</sub>の補給**：肉体的疲労時、病中病後の体力低下時、妊娠・授乳期  
**用法・用量** 7歳以上15歳未満 1日1回1錠、15歳以上1日1回2錠をそのままかむか、口の中で溶かして服用して下さい。  
朝・昼・晚いつ服用してもかまいません。水と一緒に服用することもできます。

**用法用量に関連する注意** 1. 本剤の使用により、尿が黄色くなる場合がありますが、配合されているビタミンB<sub>2</sub>の一部が尿中に排泄されるため心配はありません。2. 定められた用法・用量をお守り下さい。3. かむか、口の中で溶かして服用して下さい。4. 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させて下さい。5. 図のようにシート包装の凸部を指先で押して錠剤を取り出して服用して下さい。誤ってシート包装のまま飲み込んだりすると食道粘膜に突き刺さる等の思わぬ事故につながりますのでご注意ください。

成分 2錠中(3.33キログラム)  
ビタミンB<sub>2</sub>.....20mg 傷んだ皮膚や粘膜を回復させます。  
ビタミンB<sub>6</sub>.....50mg 皮膚や粘膜の細胞の新陳代謝を助けます。  
ビタミンC.....550mg お肌のコラーゲンを作り出します。  
添加物としてトウモロコシデンプン、粉末還元麦芽糖キレート、スクラロース、スクラリン®(MVG)、ロ、ソニトール、軽質無水ケイ酸、ヒドロキシプロピルセルロース、黄色5号、香料を含有します。



販売 日本製薬工業株式会社  
大塚市中央区北野町4丁目2番3号  
お客様相談窓口 ☎03-6222-0441  
土・日・夜受線 ☎9-000-17-00  
総機販売先 日新薬品工業株式会社  
〒254 0101 静岡県甲斐市甲斐町田原野80-1  
☎0901-20-149-991  
④登録商標

肌あれ・にきび・口内炎に 第3類医薬品

マスチゲン®BBチュアブル錠

水なしでポリポリとかんで服用

12錠入

マンゴー味



肌あれ・にきび・口内炎に

マスチゲン®  
BBチュアブル錠

ビタミンC・B<sub>2</sub>・B<sub>6</sub>配合

服用は1日1回

水なしでポリポリとかんで服用

12錠入

マンゴー味



肌あれ・にきび・口内炎に 第3類医薬品

マスチゲン®BBチュアブル錠

水なしでポリポリとかんで服用

12錠入

マンゴー味



**保管及び取扱い上の注意**  
1. アルミ袋開封後は、お早めに服用して下さい。  
2. 使用期限を過ぎた製品、開封後、使用前に開封された形跡のある製品は服用しないで下さい。3. 直射日光の当たらない涼しい場所に保管して下さい。4. 小児の手の届かない所に保管して下さい。5. 他の容器に入れ替えないで下さい。誤用の原因になったり品質が変わります。  
ご使用に際して、この薬の説明書をよくお読み下さい。また、必要に応じて医師にご相談して下さい。

**副作用上の注意**  
1. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、速ちに服用を中止し、この薬を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。  
副作用  
胃腸不快感、胃痛膨満感、食欲不進、吐き気、嘔吐、下痢  
2. 服用後、次の症状があらわれたことがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この薬を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。下痢  
3. 1ヵ月位服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この薬を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。