

△【使用上の注意】 ■ 相談すること

1.服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	胃部不快感

2.服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強がみられた場合には、服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること 下痢

3.1ヵ月位服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

【効能・効果】●次の諸症状の緩和:肌あれ、にきび、口内炎、口角炎、口唇炎、舌炎、湿疹、皮膚炎、かぶれ、ただれ、赤鼻、目の充血、目のかゆみ「ただし、これらの症状について、1ヵ月ほど使用しても改善がみられない場合は、医師又は薬剤師に相談すること。」●次の場合のビタミンB₂の補給:肉体疲労時、妊娠・授乳期、病中病後の体力低下時

【用法・用量】成人(15歳以上)1回1本(50mL)を1日1回服用してください。

【成分・分量】1本(50mL)中 リポフラビンリン酸エステルナトリウム(ビタミンB₂リン酸エステル)30mg、ピリドキシン塩酸塩(ビタミンB₆)50mg、ニコチン酸アミド60mg、チアミン硝酸塩(ビタミンB₁硝酸塩)10mg、ヨクイニンエキス150mg(ヨクイニンとして1950mg)

添加物:エリスリトール、DL-リンゴ酸、クエン酸、クエン酸Na、スクラロース、アセスルファムK、香料

03TRELAJ

肌あれ・にきび 口内炎

ビタミンB₂・B₆
ヨクイニンエキス配合

ステラスBB ドリンクライト



《ノンカフェイン》 第3類医薬品

製造販売元



中外医薬生産株式会社
三重県伊賀市ゆめが丘7-5-5

販売名

ステラスBBドリンクライト
ビタミンB₂主薬製剤
【保管及び取扱い上の注意】(1)直射日光の当たらない涼しい所に保管すること。(2)小児の手の届かない所に保管すること。(3)他の容器に入れ替えないこと(誤用の原因になったり品質が変わる。)(4)使用期限を過ぎた製品は服用しないこと。

本剤は生薬成分を配合していますので、沈殿を生じることがあります。よく振ってから服用してください。

本剤の服用により尿が黄色くなる場合がありますが、ビタミンB₂リン酸エステルによるものですので心配ありません。

副作用被害救済制度 ☎0120-149-931

お客様相談室: 0595-21-3200
受付時間 9:00~17:00(土、日、祝日を除く)