

△【使用上の注意】 ■ 相談すること

1.服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	胃部不快感

2.服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強がみられた場合には、服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。▼
3.1ヵ月以上服用しても症状がよくなる見込みがない場合は服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

【効能・効果】●次の諸症状の緩和 肌あれ、にきび、口内炎、口角炎、口唇炎、舌炎、湿疹、皮膚炎、かぶれたたれ、赤痢、目の充血、目のかゆみ「ただし、これらの症状については、1ヵ月ほど使用しても改善がみられない場合は、医師又は薬剤師に相談すること。」●次の場合のビタミンB₂の補給 肉体的疲労、妊娠、授乳期、病中病後の体力低下時

【用法・用量】成人15歳以上の1回1本(50mL)を1日1回服用してください

【成分・分量】1本(50mL)中、リボフラビン(ビタミンB₂)、シアナコキニン(ビタミンB₆)、パントチン酸(ビタミンB₅)、ニコチン酸アミド(ビタミンB₃)、チアミン(ビタミンB₁)、コリン(ビタミンB₄)、ヨクイニンエキス15.0mg(ヨクイニンとして1.950mg)

添加物：エリスリトール、DL-リンゴ糖、クエン酸、クエン酸Na、スクラロース、アセスルファムK、香料
GSRBELCH

疲れたお肌に 50mL

ノンカフェイン

1.5kcal
1びん

セロラ

Vitamin B

ドリンクライト

ビタミンB₂・B₆

肌あれ

ヨクイニンエキス

にきび

第3類医薬品

口内炎

製造販売元



中外医薬生産株式会社

三重県伊賀市ゆめが丘7-5-5

販売名

セロラBBドリンクライト
ビタミンB₂主薬製剤
【保管及び取扱以上の注意】(1)直射日光の当たらない涼しい所に保管すること。(2)小児の手の届かない所に保管すること。(3)他の容器に入れ替えないこと(誤用の原因になったり品質が変わる。)(4)使用期限を過ぎた製品は服用しないで。

本剤は生薬成分を配合していますので、過敏を生じることがあります。よく振ってから服用してください。本剤の服用により尿が黄色くなる場合がありますが、ビタミンB₂・パントチン酸エステルによるものですので心配ありません。副作用被害救済制度 ☎0120-149-931

お客様相談室 ☎095-21-3200
受付時間 9:00~17:00(土、日、夜祭を除く)

ガラス：ピン 金属：キャップ

製造番号

使用期限

4

987307520317

