

小【使用上の注意】 ■ 相服すること
 1.服用後、次の症状があらわれた場合は服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。

服用部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	胃部不快感

2.服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強がみられた場合には、服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。①同3ヵ月ほど服用しても症状が全く変わらない場合は服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。

【効能・効果】●次の諸症状の緩和、肌あれ、にきび、口内炎、口角炎、口瘻炎、舌炎、咽痛、皮膚炎、かゆみ、たむけ、赤痢、目の痒み、目のかゆみ、たむけ、たむけの改善に効果的。1ヵ月ほど使用しても改善がみられない場合は、医師又は薬剤師に相談すること。●次の場合のビタミンB₂の補給、肉体的疲労時、妊娠、授乳、病中病後の体力低下時。

【用法・用量】成人1回服用の1回1粒(50mL)を1日1回服用して、十分な量。

【成分・分量】1本(50mL)中、リボフラビン(ビタミンB₂)ナトリウム(ビタミンB₂リン酸エステル)30mg、ピロチンリン酸塩(ビタミンB₆)50mg、ニコチン酸(ナイアシン)400mg、チアミン(ビタミンB₁)10mg、イノシトール100mg、コクサニンLキス150mg(コクサニンとして1850mg)。

赤坂堂エリスリトール、DL-リンゴ酸、クエン酸、クエン酸Na、スクラロース、アセスルファムK、香料、(SPH)10%

疲れたお肌に

ノンカフェイン

ラパール
 Vitamin
B
 ドリンクライト

肌あれ
 にきび
 口内炎

1.5kcal
 1びん

ビタミンB₂・B₆
 ヨクイニンエキス

50mL 第3類医薬品

総代理店 中外医薬生産株式会社
 三重県伊賀市ゆめが丘7-5-5

販売名
 ラ(ール)B8ドリンクライト
 ビタミンB₂主薬製剤
 【保管及び取扱以上の注意】(1)直射日光の当たらない涼しい所に保管すること。(2)小児の手の届かない所に保管すること。(3)他の容器に入れ替えないこと(常用の原因になったり品質が変わる。)(4)使用期限を過ぎた製品は服用しないこと。

本剤は生薬成分を配合していますので、効果を生じることがあります。よく振ってから服用してください。本剤の服用により肌が着色することがありますが、ビタミンB₆リン酸塩(ピロチン)によるものですので心配ありません。副作用検査済制度 ☎0120-149-931

お客様相談室：0695-21-3200
 受付時間：9:00~17:00(土、日、祝日を除く)
 ガラス・ビン 金 属：キャップ

製造番号

使用期限

