

ご使用に際して、この添付文書を必ずお読みください。  
また、必要な時に読めるように大切に保管してください。

“しっしん、にきび、肌あれの症状の緩和に”（ビタミンB<sub>2</sub>製剤）

# フルタイムBB錠


第3類医薬品

## 特徴

ビタミンB<sub>2</sub>は、「皮膚・粘膜ビタミン」、「脂質代謝ビタミン」とも呼ばれ、皮膚や粘膜の正常な機能を保つために必要であり、又、脂肪の摂取が増えた現代人の健康維持に欠かせないビタミンです。

フルタイムBB錠は、体内で利用されやすい持続型のリボフラビン酪酸エステルを主成分とし、新しい細胞を作り出す時に重要な手助けをするピリドキシン塩酸塩、皮膚機能を正常化し、健康な素肌を保つビオチン、生葉ヨクイニンの各成分が配合された服用しやすい小型錠のビタミン複合剤です。

## △ 使用上の注意



### 相談すること

- 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性がありますので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症状
消化器	胃部不快感、胃部膨満感、食欲不振、吐き気・嘔吐

- 服用後、次の症状があらわれることがありますので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

下痢

- 1ヵ月位服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

## 効能・効果

### ○次の諸症状の緩和：

口内炎、口角炎、口唇炎、舌炎、湿疹、皮膚炎、かぶれ、ただれ、にきび、肌あれ、赤鼻、目の充血、目のかゆみ

「ただし、これらの症状について1ヵ月ほど使用しても改善がみられない場合は、医師又は薬剤師にご相談ください。」

### ○次の場合のビタミンB<sub>2</sub>の補給：

肉体疲労時、妊娠・授乳期、病中病後の体力低下時

## 用法・用量

次の量を食後に服用してください。

年齢	15才以上	11才以上 15才未満	7才以上 11才未満	7才未満
1回量	2～3錠	1～2錠	1錠	服用しないこと
服用回数		1日2回		

### 【用法・用量に関する注意】

- 定められた用法・用量を厳守してください。
- 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用してください。  
(裏面に続く)

## 成分・分量 1日量（6錠中）

成 分	分 量	作 用
リボフラビン酢酸エステル (ビタミンB <sub>2</sub> 酢酸エステル)	20mg	「皮膚・粘膜のビタミン」、「脂肪分解ビタミン」といわれており、皮膚の新陳代謝、脂質代謝を促進する持続型のビタミンB <sub>2</sub> です。
ピリドキシン塩酸塩 (ビタミンB <sub>6</sub> )	50mg	脂質やタンパク質の代謝を促進し、皮膚・粘膜の健康を維持します。
ビオチン	21μg	皮膚の脂質代謝機能を正常に保ち、皮膚組織の働きを強化します。
ヨクイニン末	600mg	体内の老廃物の代謝を促進し、解毒作用を行う。

添加物として、結晶セルロース、ヒドロキシプロピルセルロース、クロスカルメロースナトリウム、軽質無水ケイ酸、ステアリン酸マグネシウム、ヒプロメロース、タルク、アラビアゴム末、ポビドン、白糖、酸化チタン、カルナウバロウを含有する。

### 【成分に関する注意】

本剤の服用により尿が黄色くなることがあります、リボフラビン酢酸エステル(ビタミンB<sub>2</sub>)によるものですから心配ありません。

### 保管及び取扱い上の注意

- 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。
- 小児の手の届かない所に保管してください。
- 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わります。)
- 容器内に乾燥剤が入っています。これ(乾燥剤)は服用しないでください。
- フタの閉め方が不充分な場合、又は落下等により衝撃が加わったとき、錠剤が割れるおそれがありますので、服用のつど必ずフタはよく閉めてお取扱い等にご注意ください。(割れた錠剤は容器よりお出しください。)
- 本品は糖衣錠ですから、水分が錠剤につくと表面の糖衣が一部溶けて変色又はムラを生ずることがありますので、ぬれた手で取扱わないようにしてください。又、一度取り出して手にのせた錠剤は、元に戻さないでください。  
(変質防止のため)
- 配置期限(外箱・ラベルに記載)を過ぎた製品は、服用しないでください。  
なお期限内であっても、一度開封した後は、品質保持の点から開封日より6ヵ月以内に服用してください。

本品についてのお問い合わせは、下記にお願い申し上げます。

至誠堂製薬株式会社 TEL. 0745 (62) 5555

受付時間 10:30~15:00(土、日、祝日を除く)

お客様相談室へ

発 売 元 **タイト株式会社**  
〒939-8221 富山県富山市八日町326番地

製造販売元 **至誠堂製薬株式会社**  
〒639-2241 奈良県御所市茅原220-1

◎FB-4