

使用前にこの説明文書を必ずお読み下さい。
また、必要な時に読めるよう大切に保管して下さい。

ビタミンC主薬製剤

第3類医薬品 しみ、そばかす、日やけ・かぶれによる色素沈着の緩和に

トランシーノ[®] ホワイトC

かんぱん
(肝斑の改善薬ではありません)

トランシーノ ホワイトCの特徴

- L-システインがビタミンC、ビタミンEと協力して、しみやそばかすの原因となるメラニンの生成を抑制。さらにお肌の新陳代謝を進め、メラニンの排出を促進することにより、しみ、そばかすや日やけによる色素沈着を緩和します。
- ビタミンCが出来てしまった黒色メラニンの色を薄くします。

⚠ 使用上の注意



相談すること

- 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。
 - (1) 医師の治療を受けている人
 - (2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人
- 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性がありますので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消 化 器	吐き気・嘔吐、胃部不快感、腹痛

- 服用後、次の症状があらわれることがありますので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。
下痢、便秘
- 1カ月位服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この文書を持って医師、歯科医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。
- 服用後、生理が予定より早くきたり、経血量がやや多くなったりすることがあります。出血が長く続く場合は、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。

効能・効果

- 次の諸症状の緩和：しみ、そばかす、日やけ・かぶれによる色素沈着
- 次の場合の出血予防：歯ぐきからの出血、鼻出血

「ただし、これらの症状について、1カ月ほど使用しても改善がみられない場合は、医師、薬剤師又は歯科医師に相談して下さい」

- 次の場合のビタミンCの補給：肉体疲労時、妊娠・授乳期、病中病後の体力低下時、老年期

■ 用法・用量

次の量の水又はお湯で服用して下さい。

年 齢	1 回量	1 日服用回数
成人 (15 歳以上)	3 錠	2 回 朝夕服用して下さい。
7 歳以上 15 歳未満	1 錠	
7 歳 未 満	服用しないで下さい。	

〈用法・用量に関連する注意〉

- (1) 用法・用量を厳守して下さい。
- (2) 7歳以上の小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させて下さい。

■ 成分・分量

本剤は、わずかにだいたい色を帯びた白色～白色のフィルムコーティング錠で、6錠中に次の成分を含有しています。

アスコルビン酸 (ビタミンC)	1000mg
L-システイン	240mg
コハク酸 <i>d</i> - α -トコフェロール (天然型ビタミンE)	50mg
リボフラビン (ビタミンB ₂)	6mg
ピリドキシン塩酸塩 (ビタミンB ₆)	12mg

添加物：トウモロコシデンプン、乳糖、セルロース、CMC、ヒドロキシプロピルセルロース、ステアリン酸Mg、ヒプロメロース、ポリビニルアルコール (部分けん化物)、酸化チタン、タルク、大豆レシチン、カルナウバロウ

〈成分・分量に関連する注意〉

- (1) 本剤の服用により、尿及び便の検査値に影響を与えることがあります。医師の検査を受ける場合は、ビタミンCを含有する製剤を服用していることを医師に知らせて下さい。
- (2) 本剤に配合されているリボフラビン (ビタミンB₂) により、尿が黄色になることがあります。

■ 保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管して下さい。
- (2) 小児の手の届かない所に保管して下さい。
- (3) 他の容器に入れ替えないで下さい。(誤用の原因になったり品質が変わります)
- (4) 容器のキャップのしめ方が不十分な場合は、湿気などの影響により本剤が変質するおそれがありますので、服用後はそのつど必ずキャップをしっかりとめて下さい。
- (5) めれた手で取り扱わないで下さい。水分が錠剤につくと、表面が一部溶けて、変色又は色むらを生じることがあります。また、めれた錠剤をビンに戻すと他の錠剤にも影響を与えますので、戻さないで下さい。
- (6) ビンの中の詰め物は輸送中の錠剤破損防止用ですので、開封後は捨てて下さい。
- (7) ビンの中に乾燥剤を入れてありますので、薬を使い終わるまでは捨てないで下さい。また、間違っても服用しないよう注意して下さい。
- (8) 表示の使用期限を過ぎた製品は使用しないで下さい。

本品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店又は下記にお願い致します。

第一三共ヘルスケア株式会社 トランシーノ相談室

〒103-8234 東京都中央区日本橋3-14-10

電 話 0120-013-416

受付時間 9:00～17:00 (土、日、祝日を除く)

トランシーノブランドの詳しい情報は www.transino.jp

01®登録商標



Daiichi-Sankyo

販売元

第一三共ヘルスケア株式会社

東京都中央区日本橋3-14-10

ホームページ <http://www.daiichisankyo-hc.co.jp/>

製造販売元

京都薬品工業株式会社

京都市中京区西ノ京月輪町38

G15YQ
HO