

シミ、ソバカス、ニキビ改善薬

FEMEAL WHITE

L-システイン配合ビタミンC主薬製剤

フェミール® ホワイトNKB

第3類医薬品

フェミール® ホワイトNKBの特徴

○シミ、ソバカスを改善する成分として、アミノ酸の一種であるL-システインと、ビタミンC、E、B₂、B₆を配合し、できてしまったメラニン色素の沈着を表皮の下層部から緩和します。

Step1. 生成を抑制


アミノ酸の一種であるL-システインと、ビタミンCがメラニンの過剰な生成を抑制します。

Step2. 無色化を促進

ビタミンCが、沈着した黒色のメラニンを無色化していきます。

Step3. 排出を促進

天然型ビタミンEが血行をよくし、さらにビタミンB₂・B₆・L-システインがターンオーバー（肌の新陳代謝）を促進し、メラニンの排出を早め、お肌の正常な働きを保ちます。



※イメージ図

○ニキビを改善する成分として、脂質の代謝を助けるビタミンB₂、ターンオーバー（肌の新陳代謝）を促進するビタミンB₂・B₆・L-システインを配合し、体の内側からニキビを緩和します。

⚠ 使用上の注意



相談すること

- 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
 - (1) 医師の治療を受けている人
 - (2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人
- 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性がありますので、直ちに服用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	吐き気・嘔吐、胃部不快感、腹痛

- 服用後、次の症状があらわれることがありますので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

●下痢、便秘

- 1ヵ月位服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この説明文書を持って医師、歯科医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
- 服用後、生理が予定より早くきたり、経血量がやや多くなったりすることがあります。出血が長く続く場合は、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

効能・効果

- 次の諸症状の緩和：しみ、そばかす、日やけ・かぶれによる色素沈着
- 次の場合の出血予防：歯ぐきからの出血、鼻出血
「ただし、これらの症状について、1ヵ月ほど使用しても改善がみられない場合は、医師、薬剤師又は歯科医師に相談してください。」
- にきび、湿疹、じんましん、かぶれ、くすりまけ
- 次の場合のビタミンCの補給：肉体疲労時、妊娠・授乳期、病中病後の体力低下時、老年期

用法・用量

- 次の量を、水又はお湯で服用してください。

年齢	1回量	1日服用回数
成人（15歳以上）	2錠 	3回 （食前又は食後）
7歳以上15歳未満	1錠 	
7歳未満	服用しないこと 	

【用法・用量に関連する注意】

- (1) 用法・用量を厳守してください。
- (2) 7歳以上の小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。

成分・分量

本剤は、白色～わずかにだいだい色を帯びた白色のフィルムコーティング錠で、6錠中に次の成分を含有します。

L-システイン	240mg
アスコルビン酸(ビタミンC)	1000mg
リボフラビン(ビタミンB ₂)	6mg
ピリドキシン塩酸塩(ビタミンB ₆)	12mg
コハク酸d-α-トコフェロール(天然型ビタミンE)	50mg

添加物：トウモロコシデンプン、乳糖水和物、セルロース、CMC、ヒドロキシプロピルセルロース、ステアリン酸Mg、ヒプロメロース、ポリビニルアルコール(部分ケン化物)、酸化チタン、タルク、大豆レシチン、カルナウバロウ

【成分・分量に関連する注意】

- (1) 本剤の服用により、尿および大便の検査値に影響を与えることがあります。医師の検査を受ける場合、ビタミンC製剤を服用していることを医師にお知らせください。
- (2) 本剤の服用により、尿が黄色になることがありますが、これは本剤に含まれるリボフラビン(ビタミンB₂)によるものです。

保管および取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり、品質が変わります。)また、本剤の容器に本剤以外のものを入れないでください。
- (4) 容器の中の詰め物は、輸送中に本剤が破損するのを防止するのために入れてありますので、フタを開けた後は捨ててください。
- (5) 容器のフタのしめ方が不十分な場合は、湿気などの影響により本剤が変質するおそれがありますので、服用後はそのつど必ずフタをしっかりとめてください。
- (6) 本剤にぬれた手で触れないでください。ぬれた手にとった錠剤を元の容器にもどしますと、他の錠剤に影響を与えることがありますのでご注意ください。
- (7) 使用期限の過ぎた製品は服用しないでください。
- (8) 箱の「開封年月日」記入欄に、開封した日付を記入してください。

本品についてのお問い合わせは、下記にお願い申し上げます。

くすりのウェルベスト 通話料無料 0800-111-4193 受付時間 9:00～17:00(日、祝日を除く)

製造販売元：京都薬品工業株式会社 京都市中京区西ノ京月輪町38番地
発 売 元：富士産業株式会社 香川県丸亀市田村町1301番地

 **くすりのウェルベスト**
WELLBEST

Ⓡ：登録商標

A7RQ
F-H0