使用前にこの説明文書を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

ビタミンC主薬製剤

第3類医薬品　しみ、そばかす、日やけ・かぶれによる色素沈着の緩和に

トランシーノ®ホワイトCクリアシス

トランシーノ ホワイトCクリアシスの特徴

- L-システインがビタミンCと協力して、しみやそばかすの原因となるメラニンの生成を抑制。さらに肌の新陳代謝を促し、メラニンの排出を促進することにより、しみ、そばかすや日やけによる色素沈着を緩和します。
- ビタミンCが出来てしまった黒色メラニンを無色化していきます。
- 肌をすこやかに導く5種のビタミン（E、B_2、B_6、B_3、パントテン酸カルシウム）配合

⚠ 使用上の注意

相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
   (1) 医師の治療を受けている人
   (2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人
2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性がありますので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	吐き気・嘔吐、胃部不快感、腹痛

3. 服用後、次の症状があらわれることがありますので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
   下痢、便秘
4. 1カ月位服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この文書を持って医師、歯科医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
5. 服用後、生理が予定より早くきたり、経血量がやや多くなったりすることがあります。出血が長く続く場合は、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

効能・効果

1. 次の諸症状の緩和：しみ、そばかす、日やけ・かぶれによる色素沈着
2. 次の場合のビタミンCの補給：肉体疲労時、妊娠・授乳期、病中病後の体力低下時、老年期
3. 次の場合の出血予防：歯ぐきからの出血、鼻血

「ただし、上記１及び３の症状について、１カ月ほど使用しても改善がみられない場合は、医師、薬剤師又は歯科医師に相談してください」

■ 用法・用量

次の量を水又はお湯で服用してください。

年　齢	1回量	1日服用回数
成人（15歳以上）	2錠	2回 朝夕服用してください。
7歳以上15歳未満	1錠	
7　歳　未　満	服用しないでください。	

〈用法・用量に関連する注意〉

(1) 用法・用量を厳守してください。
(2) 食前・食後、いずれの服用でもかまいません。
(3) 7歳以上の小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。

■ 成分・分量

本剤は白色～わずかに赤みを帯びた白色のフィルムコーティング錠で、4錠中に次の成分を含有しています。

成　分	分　量
アスコルビン酸（ビタミンC）	1000mg
L-システイン	240mg
コハク酸d-α-トコフェロール（天然型ビタミンE）	50mg
リボフラビン（ビタミンB_2）	6mg
ピリドキシン塩酸塩（ビタミンB_6）	12mg
ニコチン酸アミド（ビタミンB_3）	60mg
パントテン酸カルシウム	24mg

添加物：トウモロコシデンプン、乳酸Ca、乳糖、セルロース、カルメロース、ヒドロキシプロピルセルロース、ステアリン酸Mg、ヒプロメロース、酸化チタン、タルク、マクロゴール、カルナウバロウ

〈成分・分量に関連する注意〉

(1) 本剤の服用により、尿及び便の検査値に影響を与えることがあります。医師の検査を受ける場合は、ビタミンCを含有する製剤を服用していることを医師に知らせてください。
(2) 本剤に配合されているリボフラビン（ビタミンB_2）により、尿が黄色になることがあります。

■ 保管及び取扱い上の注意

(1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。
(2) 小児の手の届かない所に保管してください。
(3) 他の容器に入れ替えないでください。（誤用の原因になったり品質が変わります）
(4) 容器のキャップのしめ方が不十分な場合は、湿気などの影響により本剤が変質するおそれがありますので、服用後はそのつど必ずキャップをしっかりしめてください。
(5) ぬれた手で取り扱わないでください。水分が錠剤につくと、表面が一部溶けて、変色又は色むらを生じることがあります。また、ぬれた錠剤をビンに戻すと他の錠剤にも影響を与えますので、戻さないでください。
(6) ビンの中の詰め物は輸送中の錠剤破損防止用ですので、開封後は捨ててください。
(7) ビンの中に乾燥剤を入れてありますので、薬を使い終わるまでは捨てないでください。また、間違って服用しないよう注意してください。
(8) 表示の使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。

本品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店又は下記にお願い致します。
第一三共ヘルスケア株式会社　トランシーノ相談室
〒103－8234　東京都中央区日本橋3－14－10
電　　話　0120－013－416
受付時間　9：00～17：00（土、日、祝日を除く）

トランシーノについて詳しくは　www.transino.jp

H0　01 ® 登録商標

販売元
第一三共ヘルスケア株式会社
Daiichi-Sankyo
東京都中央区日本橋3－14－10
ホームページ　https://www.daiichisankyo-hc.co.jp/

製造販売元
京都薬品工業株式会社
京都市中京区西ノ京月輪町38