

販売名：クマイイビタミンCカプセル

第3類医薬品

△ 使用上の注意

■ 相談すること

1. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この外箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位：消化器 / 症状：吐き気・嘔吐

2. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この外箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること 下痢
3. 1ヵ月位服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この外箱を持って医師、歯科医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること



【成分・分量】 1カプセル中

アスコルビン酸(ビタミンC)……………500mg

添加物：トウモロコシデンプン、ゼラチン、ラウリル硫酸Na

〈成分・分量に関連する注意〉 本剤の服用により、尿及び大便の検査値に影響を与えることがあります。医師の治療を受ける場合は、ビタミンCを含有する製剤を服用していることを医師に知らせてください。

使用期限

製造番号

【用法・用量】 次の量を、水又はぬるま湯で服用してください。

年齢	1回量	服用回数
成人(15才以上)	1～2カプセル	1日2回(朝・夕)
7才～14才	1カプセル	
7才未満	服用しないこと	

〈用法・用量に関連する注意〉 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。

【効能】 ○次の諸症状の緩和：しみ、そばかす、日焼け・かぶれによる色素沈着 ○次の場合の出血予防：歯ぐきからの出血、鼻出血 「ただし、これらの症状について、1ヵ月ほど使用しても改善がみられない場合は、医師、薬剤師又は歯科医師に相談してください。」

○次の場合のビタミンCの補給：肉体疲労時、妊娠・授乳期、病中病後の体力低下時、老年期



【保管及び取扱い上の注意】 (1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。(2)小児の手の届かない所に保管してください。(3)他の容器に入れ替えないでください(誤用の原因になったり品質が変わります。)(4)ピンのフタのしめ方が不十分な場合、湿気などの影響で薬が変質することがありますので、服用のつどピンのフタをよくみてください。(5)使用期限をすぎた製品は服用しないでください。

小林薬品工業株式会社

製造販売元 岐阜県岐阜市中鶴1丁目139番地

お客様相談室 電話：0120-584-419

受付時間：10時～16時(土、日、祝日を除く)

副作用被害救済制度 ☎ 0120-149-931