

日本調剤企画


5COINS
PHARMA

ビタミンC主薬製剤(チュアブル錠)

しみ・そばかす 日焼けによる色素沈着に

1日量(12錠)ビタミンC2000mg

アスコルビン酸カルシウム・ビタミンB₂配合



120錠 第3類医薬品 (10日分)

120錠

開封後はチャックを閉じて保存してください。



服用に際しては、この説明文を必ずお読みください。

販売名:ピュアナCチュアブル錠 第3類医薬品 ビタミンC主薬製剤 120錠

△使用上の注意 相談すること

1. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症状
消化器	吐き気・嘔吐

2. 服用後、下痢の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

3. 1ヵ月位服用しても症状がよくなる見えない場合は服用を中止し、この製品を持って医師、歯科医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

【効能】●次の諸症状の緩和:しみ、そばかす、日焼け・かぶれによる色素沈着●次の場合の出血予防:歯ぐきからの出血、鼻出血「ただし、これらの症状について、1ヵ月ほど使用しても改善がみられない場合は、医師、薬剤師又は歯科医師に相談すること。」●次の場合のビタミンCの補給:肉体疲労時、妊娠・授乳期、病中病後の体力低下時、老年期

【用法・用量】 15歳以上 1回4錠、7歳以上15歳未満 1回2錠、5歳以上7歳未満 1回1錠、1日3回食後、かむか、口中で溶かして服用してください。5歳未満は服用しないでください。

<用法・用量に関連する注意>用法・用量を厳守してください。小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。

【成分・分量】 12錠中 アスコルビン酸1,000mg、アスコルビン酸カルシウム1,210mg(アスコルビン酸として1,000mg)、リポフラビン酪酸エステル12mg
添加物として、ヒドロキシプロピルセルロース、ステアリン酸Mg、エリスリトール、アスパルテーム(L-フェニルアラニン化合物)、グリチルリチン酸2K、香料を含有します。

【保管及び取扱い上の注意】 (1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所にチャックを閉めて保管してください。(2)小児の手の届かない所に保管してください。(3)誤用をさけ、品質を保持するため、他の容器に入れ替えないでください。(4)使用期限内に服用してください。

本品についてのお問合せ先
お客様相談室
☎0120-18-3548
月～金曜日(祝日を除く)
10:00～16:00

日本調剤
オンラインストア



副作用被害救済制度
☎0120-149-931



PE金属PET

2308A

使用
期限

製造 米田薬品工業株式会社
販売元 奈良県高市郡高取町市尾986

製造
番号