

ピュアナC

チュアブル錠

▼ここからお切りください。手で簡単に切れます。

服用に際しては、この説明文を必ずお読みください。

ビタミンC主薬製剤 第3類医薬品

180錠(15日分) 販売名:ピュアナCチュアブル錠

⚠️ 使用上の注意



相談すること

1. 服用後、吐き気・嘔吐の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるため、直ちに服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
2. 服用後、下痢の症状があらわれることがあるため、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
3. 1ヵ月位服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この製品を持って医師、歯科医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

【効能】

◎次の諸症状の緩和:しみ、そばかす、日やけ・かぶれによる色素沈着。◎次の場合の出血予防:歯ぐきからの出血、鼻出血。「ただし、これらの症状について、1ヵ月ほど使用しても改善がみられない場合は、医師、薬剤師又は歯科医師に相談すること。」◎次の場合のビタミンCの補給:肉体的疲労時、妊娠・授乳期、病中病後の体力低下時、老年期

【用法・用量】

15歳以上.....	1回4錠
7歳以上15歳未満.....	1回2錠
5歳以上7歳未満.....	1回1錠

<用法・用量に関連する注意>

用法・用量を厳守してください。小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。

◎1日3回食後、かむか、口中で溶かして服用してください。

【成分・分量】12錠中

アスコルビン酸1,000mg、アスコルビン酸カルシウム(アスコルビン酸として1,000mg)1,210mg、リボフラビン酪酸エステル12mg 添加物として、ヒドロキシプロピルセルロース、ステアリン酸Mg、エリスリトール、アスパルテーム(L-フェニルアラニン化合物)、グリチルリチン酸2K、香料を含有します。

【保管及び取り扱い上の注意】

(1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所にチャックを閉めて保管してください。(2)小児の手の届かない所に保管してください。(3)誤用をさせ、品質を保持するため、他の容器に入れ替えないでください。(4)使用期限内に服用してください。

製造販売元 米田薬品工業株式会社
奈良県高市郡高取町市尾986
発 売 元 株式会社富山常備薬
富山県富山市丸の内1-8-17

お問い合わせ先

株式会社 富山常備薬

☎ 0120-309-093

受付時間/9時~18時(年中無休)

●副作用被害救済制度 電話:0120-149-931

使用
期限

製造
番号



4580544061515



2512A