



2013年1月 記載要領変更に伴う改訂

**第3類  
医薬品**

ご使用に際して、この説明文書を必ずお読みください。  
また、必要な時読めるよう大切に保管してください。



### ビタミンC製剤

# エンガル<sup>®</sup>C

- 口の中で溶かしてのめるオレンジ味のチュアブル錠です。
- 6錠でビタミンCを1,500mg補給できます。
- 肉体疲労、体力低下時のビタミンCの補給に役立ちます。
- 日焼け・かぶれによる色素沈着やしみ、そばかすが気になる時、メラニン色素に働いて、効果をあらわします。
- 歯ぐきからの出血や鼻血が出やすい方に、毛細血管を丈夫にし、出血を予防します。

## ⚠ 使用上の注意



### 相談すること

1. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性がありますので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください

関係部位	症 状
消化器	吐き気・嘔吐

2. 服用後、次の症状があらわれることがありますので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください

下痢

3. 1ヵ月位服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この文書を持って医師、歯科医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください



## 〔効 能〕

- 次の諸症状の緩和：  
しみ、そばかす、日焼け・かぶれによる色素沈着
- 次の場合の出血予防：  
歯ぐきからの出血、鼻出血

「ただし、これらの症状について、1ヵ月ほど使用しても改善がみられない場合は、医師、薬剤師又は歯科医師に相談すること。」

- 次の場合のビタミンCの補給：  
肉体疲労時、妊娠・授乳期、病中病後の体力低下時、老年期

〔用法・用量〕

年 齢	1回服用量	1日服用回数
大人(15才以上)	2錠	1~3回
11~14才	2錠	1~2回
7~10才	1錠	1~3回
7才未満	服用しないでください	

いずれもかみくだくか、口の中で溶かしながら服用してください。

〈用法・用量に関連する注意〉

- (1)定められた用法・用量を厳守してください。
- (2)小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。

〔成分・分量と働き〕6錠中

成 分	分 量	働 き
ビタミンC	600mg	黒色のメラニンを淡色化し、しみ、そばかす、日焼け、かぶれによる色素沈着に効果をあらわします。
ビタミンC ナトリウム	1,012.3mg (ビタミンCとして900mg)	
パントテン酸 カルシウム	30mg	ビタミンCの働きを助け、しみ、そばかす、日焼け・かぶれによる色素沈着の緩和に効果をあらわします。

添加物として、白糖、黄色5号、ステアリン酸Mg、香料を含有します。

〈成分・分量に関連する注意〉

本剤の服用により、尿及び大便の検査値に影響を与えることがあります。医師の治療を受ける場合は、ビタミンCを含有する製剤を服用していることを医師に知らせてください。

◎保管及び取扱い上の注意

- (1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2)小児の手の届かない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れ替えないでください。  
(誤用の原因になったり品質が変わるおそれがあります。)
- (4)使用期限をすぎた製品は、服用しないでください。



副作用被害救済制度のお問い合わせ先  
(独)医薬品医療機器総合機構  
<http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai.html>  
電話 0120-149-931 (フリーダイヤル)

本製品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店又は下記にお願い申し上げます。  
佐藤製薬株式会社 お客様相談窓口  
電話 03(5412)7393  
受付時間：9:00~17:00(土、日、祝日を除く)

製造販売元  
佐藤製薬株式会社  
東京都港区元赤坂1丁目5番27号