

【医薬品】
ケシミン
LC錠



第3類医薬品



服用に際して、このパッケージを必ずお読みください。また必要なときに読めるよう大切に保管してください。使用期限(パッケージ底面及びピラベルに記載)を過ぎた製品は服用しないこと

開封日
年 月 日

押して開ける

Vitamin for Spots

第3類医薬品

販売名: LC錠

ビタミンC主薬製剤



△使用上の注意

相談すること 1. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、このパッケージを持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症状
消化器	吐き気・嘔吐

2. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、このパッケージを持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること: 下痢

3. 1ヶ月位服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、このパッケージを持って医師、歯科医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

効能・効果 ●次の諸症状の緩和: しみ、そばかす、日焼け・かぶれによる色素沈着 ●次の場合の出血予防: 歯ぐきからの出血、鼻出血「ただし、これらの症状については、1ヶ月ほど使用しても改善がみられない場合は、医師、薬剤師又は歯科医師に相談すること。」 ●次の場合のビタミンCの補給: 肉体疲労時、妊娠・授乳期、病中病後の体力低下時、老年期

用法・用量 次の量を食後に水又はお湯で服用してください

年齢	1回量	服用回数
大人(15才以上)	2錠	1日3回
7才以上15才未満	1錠	
7才未満	× 服用しないこと	

〈用法・用量に関連する注意〉

- (1) 定められた用法・用量を厳守すること
- (2) 吸湿しやすいため、服用のつどキャップをしっかりしめること
- (3) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させること

成分・分量 1日量(6錠)中: L-システイン…160mg、アスコルビン酸(ビタミンC)…500mg、ニコチン酸アミド…60mg、リボフラビン(ビタミンB₂)…12mg

添加物としてセルロース、無水ケイ酸、ヒドロキシプロピルセルロース、ステアリン酸Mg、ヒプロメロース、白糖、タルク、アラビアゴム、ゼラチン、酸化チタン、ポリオキシエチレンポリオキシプロピレンジリコール、炭酸Ca、カルナウバロウを含有する

〈成分・分量に関連する注意〉

- リボフラビンにより尿が黄色くなる場合がありますが、心配ありません
- 尿及び大便の検査値に影響を与えることがあります 医師の治療を受ける場合は、ビタミンCを含有する製剤を服用していることを医師に知らせてください

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管すること
- (2) 小児の手の届かない所に保管すること
- (3) 他の容器に入れ替えないこと(誤用の原因になったり品質が変わる)
- (4) 本剤をぬれた手で扱わないこと
- (5) ビンの中の詰め物は輸送時の破損防止用なので開封時に捨てること
- (6) 乾燥剤は服用しないこと

副作用被害救済制度 ☎0120-149-931

頑固なしみ*、そばかすに
飲んで効く

【医薬品】
ケシミン

LC錠



180錠



第3類医薬品

イメージ図

しみ、そばかす等の緩和

*頑固なしみとは繰り返し現れるしみのことです


販売名: LC錠

第3類医薬品

しみの元“黒色メラニン”を
内側から攻める!

イメージ図

メラニンの排出を促す



ビタミンC
メラニンの色
を薄くする

↑
ターンオーバーを
促進する

●L-システイン
●ビタミンC
メラニンの生成を抑制する

●L-システイン
●ビタミンC
●ビタミンB₂
●ニコチン酸アミド

製品のお問合せは、お買い求めのお店又は
お客様相談室にお願いいたします

発売元 小林製薬株式会社

〒541-0045 大阪府中央区道修町4-4-10

小林製薬 お客様相談室

0120-5884-01

9:00~17:00(土・日・祝日を除く)

製造販売元

寧薬化学工業株式会社

〒635-0035 奈良県大和高田市旭南町2番25号

10183335

MADE IN JAPAN

使用期限
(西暦年・月)

製造番号

