



【保管及び取り扱い上の注意】

1. 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。
2. 小児の手の届かない所に保管してください。
3. 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり、品質が変わることがあります。)また、本剤の容器に本剤以外のものを入れないでください。
4. 容器のフタのしめ方が不十分な場合は、湿気などの影響により本剤が変質するおそれがありますので、服用後はそのつど必ずフタをしっかりとめてください。
5. 1錠を分割した残りを服用する場合は、清潔な紙に包んで外箱の中に保管し、2日以内に服用してください。
6. 使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。
7. 一度開封した後は、品質保持の点からなるべく早く服用してください。

お問い合わせ先

本品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店又は下記までお願いします。
 日野薬品工業株式会社 お客様相談窓口
 電話0748-52-1232
 受付時間 9時～17時(土、日、祝日を除く)



詰め物 ガラス:瓶
 金属:キャップ

副作用被害救済制度 ☎0120-149-931

この箱の記載事項は服用前に必ずお読みください。また、必要なときに読めるよう本剤を入れて保管してください。

△使用上の注意

⊗してはいけないこと
 (守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります。)

次の人は服用しないでください。
 ○フェニルケトン尿症の人

■相談すること

1. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	吐き気・嘔吐

2. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合は、服用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

下痢
 3. 1ヵ月位服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この箱を持って医師、歯科医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

【成分・分量】 1日量(12錠)中

ビタミンCとして……………2,000mg
 アスコルビン酸……………1,000mg
 L-アスコルビン酸ナトリウム…1,124.79mg
 (アスコルビン酸として1,000mg)
 リボフラビン(ビタミンB₂)……………6mg

添加物として還元麦芽糖水アメ、白糖、乳糖、ステアリン酸Mg、アスパルテーム(L-フェニルアラニン化合物)、サッカリン、香料、トコフェロールを含有します。

〈成分・分量に関連する注意〉

1. ビタミンB₂は、体内に吸収されその一部が尿中に排泄されるため、尿が黄色になることがあります。
2. ビタミンCは、尿及び大便の検査値に影響を与えることがあります。従って、医師の治療を受ける場合は、本剤を服用していることを医師にお知らせください。

T1209D

Repulse C Vitamin C Repulse C Vitamin C

ビタミンC主薬製剤



1日量でビタミンC
2000mg

しみ
 そばかす
 日やけ・かぶれによる
 色素沈着



水なしで
 服用できる
 チュアブル錠

第3類医薬品
 240錠

ビタミンC主薬製剤

レパルスC

第3類医薬品

【効能・効果】

- 次の諸症状の緩和:しみ、そばかす、日やけ・かぶれによる色素沈着
 - 次の場合の出血予防:歯ぐきからの出血、鼻出血
- 「ただし、これらの症状について、1ヵ月ほど使用しても改善がみられない場合は、医師、薬剤師又は歯科医師にご相談ください。」
- 次の場合のビタミンCの補給:肉体疲労時、妊娠・授乳期、病中病後の体力低下時、老年期

【用法・用量】

次の量を服用してください。
 ただし、1日2回服用する場合は朝夕、1日3回服用する場合は朝昼晩、口の中で溶かすか、又はかみくだいて服用してください。

年 齢	1回服用量	1日服用回数
成人(15歳以上)	4錠	2~3回
11歳以上15歳未満	2½錠	
7歳以上11歳未満	2錠	
5歳以上7歳未満	1錠	
5歳未満	服用しないこと	

〈用法・用量に関連する注意〉

1. 定められた用法・用量をお守りください。
2. 5歳以上15歳未満の小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。
3. 本剤がのどにつかえることのないよう、よく注意してください。

製造販売元

日野薬品工業株式会社
 滋賀県蒲生郡日野町上野田119