

この説明書は本剤とともに保管し、服用に際しては必ずお読み下さい。

ビタミンC主薬製剤

ランスミンC

第3類医薬品

ランスミンCは

- ・日やけやしみなど色素沈着の緩和
 - ・歯ぐきや鼻からの出血の予防
 - ・肉体疲労時などのビタミンCの補給
- を目的としたビタミンC主薬製剤です。

△使用上の注意



- 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい

関係部位	症 状
消化器	吐き気・嘔吐

- 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい
下痢

- 1ヵ月位服用しても症状が良くならない場合は服用を中止し、この文書を持って医師、歯科医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい

成分と作用 本品1日量（6錠）中

成 分	分 量	作 用
アスコルビン酸（ビタミンC）として (アスコルビン酸 (L-アスコルビン酸ナトリウム	2000.00mg 1000.00mg 1124.79mg	日やけ、しみなどの色素沈着を緩和すると共に、コラーゲンの生成に関与し、毛細血管を丈夫にするので歯ぐきや鼻からの出血を予防します。
リボフラビン酪酸エステル (ビタミンB ₂ 酪酸エステル)	6.00mg	皮膚や粘膜を保護するビタミンであり、皮膚の新陳代謝を促進します。

添加物として、トウモロコシデンプン、結晶セルロース、ヒドロキシプロピルセルロース、クロスポビドン、軽質無水ケイ酸、ステアリン酸マグネシウムを含有します。

<成分及び分量に関する注意>

- (1) 本剤の服用により、尿及び大便の検査値に影響を与えることがあります。医師の治療を受ける場合は、ビタミンCを含有する製剤を服用していることを医師に知らせて下さい。
- (2) 本剤に配合されているリボフラビン酔酸エステルにより、尿が黄色になることがあります。

効能又は効果

- 次の諸症状の緩和：
しみ、そばかす、日やけ・かぶれによる色素沈着
- 次の場合の出血予防：
歯ぐきからの出血、鼻出血
「ただし、これらの症状について、1ヶ月ほど使用しても改善がみられない場合は、医師、薬剤師又は歯科医師に相談して下さい」
- 次の場合のビタミンCの補給：
肉体疲労時、妊娠・授乳期、病中病後の体力低下時、老年期

用法及び用量

次の1回量を1日2回食後に服用して下さい。

年 齢	成人（15才以上）	11才以上15才未満	7才以上11才未満	7才未満
1回量	1~3錠	1~2錠	1錠	服用しないこと

<用法及び用量に関する注意>

- (1) 用法及び用量を厳守して下さい。
- (2) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させて下さい。

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管して下さい。
- (2) 小児の手のとどかない所に保管して下さい。
- (3) 他の容器に入れ替えないで下さい。(誤用の原因になったり品質が変わることがあります。)
- (4) 使用期限を過ぎた製品は服用しないで下さい。

■お問い合わせ先。

伊丹製薬株式会社 お客様相談室 TEL 0740-22-2059

受付時間：9時から16時30分まで（土、日、祝日を除く）

副作用被害救済制度

☎0120-149931



製造販売元

伊丹製薬株式会社

滋賀県高島市今津町下弘部280番地