

ご使用に際して、この説明書を必ずお読みください。  
また、必要な時に読めるように大切に保管してください。

“ビタミンCの補給に” (ビタミンC主薬製剤)

# ビルタミンC-2000

第3類医薬品

ビタミンC(アスコルビン酸)は、結合組織の主成分であるコラーゲンの生成・維持に関与し、毛細血管を丈夫にしたり、皮ふのメラニン形成に関与し、色素沈着をおさえたりする生理的・薬理的に重要な働きをする大切なビタミンです。人は体内でつくる事が出来ないのので、食品又は医薬品から摂取する必要があります。ビルタミンC-2000は3包でビタミンCを2000mg摂取できる顆粒タイプのビタミンC製剤です。

## 働 き

1. 筋肉疲労時、妊娠・授乳期、病中病後の体力低下時や老年期のビタミンCの補給に役立ちます。
2. 皮ふのメラニン色素に働いて、しみ、そばかす、日やけによる色素沈着の緩和に効果をあらわします。
3. 細胞と細胞をつなぐコラーゲンの生成に関与して、血管壁を丈夫にし、歯ぐきからの出血や鼻出血に効果をあらわします。

## 特 徴

1. しみ、そばかすなどの緩和に必要な主成分のビタミンCに皮ふに関連するビタミンB<sub>2</sub>を配合しています。
2. ビタミンC2000mgが3包で摂取できます。
3. 甘酸っぱくて飲みやすい味です。
4. 低カロリーです。

## ⚠ 使用上の注意



### 相談すること

1. 次の人は服用前に医師又は薬剤師に相談すること。  
(1) 次の診断を受けた人。 フェニルケトン尿症
2. 次の場合は、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、歯科医師又は薬剤師に相談すること。  
(1) 服用後、次の症状があらわれた場合。
 

関係部位	症 状
消化器	悪心・嘔吐

  
 (2) 1ヵ月位服用しても症状がよくならない場合。
3. 次の症状があらわれることがあるので、このような症状の継続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、医師又は薬剤師に相談すること。 下痢

## 効能・効果

- 次の諸症状の緩和  
しみ、そばかす、日やけ・かぶれによる色素沈着
- 次の場合の出血予防  
歯ぐきからの出血、鼻出血  
「ただし、これらの症状について、1ヵ月ほど使用しても改善がみられない場合は、医師、薬剤師又は歯科医師にご相談ください。」
- 次の場合のビタミンCの補給  
肉体疲労時、妊娠・授乳期、病中病後の体力低下時、老年期

(裏面に続く)

## 用法・用量

次の量を食後又は食間に服用します。

年 齢	15才以上	11才以上 15才未満	7才以上 11才未満	3才以上 7才未満	1才以上 3才未満	1才未満
1 回 量	1 包	2 / 3 包	1 / 2 包	1 / 3 包	1 / 4 包	服用しない こと
服用回数	1日3回					

### 【用法・用量に関連する注意】

1. 定められた用法・用量を厳守してください。
2. 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用してください。

## 成分・分量 1日量：3包(1包1.5g×3)

成 分	分 量	作 用
ビタミンCとして (アスコルビン酸 L-アスコルビン酸ナトリウム (アスコルビン酸として1000mg))	2000mg  ( 1000mg 1124.79mg )	日やけや、しみなどの色素の沈着を緩和し、血管壁を丈夫にし、歯ぐきからの出血や鼻出血を予防します。
リボフラビン (ビタミンB <sub>2</sub> )	9mg	皮ふや粘膜の働きを整えて、肌を健康に保ちます。

添加物として、D-マンニット、乳糖水和物、アスパルテーム(L-フェニルアラニン化合物)を含む。

### 【成分に関連する注意】

1. 本剤の服用により尿が黄色くなることがあります。リボフラビン(ビタミンB<sub>2</sub>)によるものですから心配ありません。
2. 本剤は尿及び大便検査値に影響を及ぼすことがありますので、尿及び大便の検査を受ける場合は、本剤の服用を医師にお知らせください。

## 保管及び取扱い上の注意

1. 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
2. 小児の手の届かない所に保管してください。
3. 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わります。)
4. 1包を分割した残りを服用する場合には、袋の口を折り返して保管し、2日以内に服用してください。
5. 使用期限(外箱に記載)を過ぎた製品は服用しないでください。

本品についてのお問い合わせは、下記にお願い申し上げます。  
至誠堂製薬株式会社 TEL.0745(62)5555  
受付時間 10:30~15:00(土、日、祝日を除く)  
お客様相談室へ

