

しみ、そばかす
色素沈着の緩和に

WA

WHITE ALL

ホワイトール

第3類医薬品

L-システイン配合 ビタミンC主薬製剤

180錠入

WHITE ALL

販売名:ホワイトール

第3類医薬品

効能・効果

- 次の諸症状の緩和:しみ、そばかす、日やけ・かぶれによる色素沈着
- 次の場合の出血予防:歯ぐきからの出血、鼻出血「ただし、これらの症状について、1ヶ月ほど使用しても改善がみられない場合は、医師、薬剤師又は歯科医師に相談すること。」
- 次の場合のビタミンCの補給:肉体疲労時、妊娠・授乳期、病中病後の体力低下時、老年期

用法・用量

次の量を朝晩に服用してください。

年齢	1回量	服用回数
成人(15歳以上)	3錠	1日2回
7歳以上15歳未満	1錠	
7歳未満	服用しないこと	

〈用法・用量に関連する注意〉

用法・用量を厳守してください。小児に服用される場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。

成分・分量 1日量(6錠中)

アスコルビン酸(ビタミンC)	1000mg
L-システィン	240mg
リボフラビン(ビタミンB ₆)	6mg
ピロドキシン塩酸塩(ビタミンB ₆)	12mg
コハク酸d-α-トコフェロール	
(天然型ビタミンE)	50mg
添加物として、トウモロコシデンプン、結晶セルロース、クロスカルメロースナトリウム、メタケイ酸アルミン酸マグネシウム、ステアリン酸マグネシウム、ヒプロメロース、酸化チタン、マクロコールを含む。	

〈成分・分量に関連する注意〉

- (1)本剤の服用により、尿及び大便の検査値に影響をおよぼすことがありますので、これらの検査を受ける場合は、本剤を服用していることを医師にお知らせください。
- (2)本剤の服用により尿が黄色くなることがありますですが、これは本剤に含まれるリボフラビン(ビタミンB₆)によるものですから心配ありません。

〈注意〉●服用に際しては、この面をよく読んでください。●直射日光の当たらない温氣の少ない涼しい所にチャックを閉じて保管してください。●小児の手の届かない所に保管してください。●他の容器に入れ替えないでください(誤用の原因になったり、品質が変わります。)●袋のチャックのしめ方が不十分な場合は、温氣などの影響により本剤が変質する恐れがありますので、服用後は、そのつど必ずチャックをしっかりと閉めてください。●ぬれた手で触れないでください。水分が錠剤につくと、表面が一部溶けて、変色又は色むらを生じる事があります。また、ぬれた錠剤を袋に戻すと他の錠剤にも影響を与えますので、戻さないでください。●使用期限を過ぎた製品は、服用しないでください。なお、期限内であっても、一度開封した後は、品質保持の点から開封日より、6ヶ月以内に服用してください。●袋の中に乾燥剤が入っています。服用しないでください。

発売元 株式会社フォーマルクライ
福岡県福岡市博多区博多駅前1-5-1
☎ 0120-043-469

製造販売元 至誠堂製薬株式会社
奈良県御所市茅原220-1

本品についてのお問い合わせは	
至誠堂製薬株式会社 お客様相談室	受付時間 10:30~15:00
TEL 0745(62)5555	(土・日・祝日を除く)
副作用被害救済制度 ☎ 0120-149-931	

L-システィン配合ビタミンC主薬製剤

使用期限

製造番号



△ 使用上の注意

相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること(1)医師の治療を受けている人 (2)薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人

2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	吐き気・嘔吐、胃部不快感、腹痛

3. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
下痢、便秘

4. 1ヵ月位服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この製品を持って医師、歯科医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

5. 服用後、生理が予定より早くたり、経血量がやや多くなったりすることがある。出血が長く続く場合は、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること



4 571305 243004



18FC1
版No.1