

124錠

成人31日分

1日2回

1回2錠

# BRIGHTAGE WHITE

ブライトエイジ ホワイト

しみ・そばかす対策に

L-システイン240mg

ビタミンC1000mg

5種のビタミン配合

第3類医薬品

開封後はチャックを閉めて保管して下さい。

チャック

使用前にこの袋の説明文書を必ずお読み下さい。

ブライトエイジ® ホワイト

**使用上の注意**

**相談すること**

- 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。
  - 医師の治療を受けている人
  - 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人
- 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この袋を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	吐き気・嘔吐、胃部不快感、腹痛

- 服用後、次の症状があらわれることがありますので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この袋を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。  
下痢、便秘
- 1カ月位服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この袋を持って医師、歯科医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。
- 服用後、生理が予定より早くきたり、経血量がやよくなったりすることがあります。出血が長く続く場合は、この袋を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。

**効能・効果**

- 次の諸症状の緩和：しみ、そばかす、日焼け・かぶれによる色素沈着
- 次の場合のビタミンCの補給：肉体疲労時、妊娠・授乳期、病中病後の体力低下時、老年期
- 次の場合の出血予防：歯ぐきからの出血、鼻血  
[ただし、1および3の症状について、1カ月ほど使用しても改善がみられない場合は、医師、薬剤師又は歯科医師に相談して下さい]

販売元 株式会社アイム  
香川県高松市香南町横井460-1

お問合せ先  
**0120-26-7877**

製造 至誠堂製薬株式会社  
販売元 奈良県御所市茅原220-1

発売元 第一三共ヘルスケア株式会社  
東京都中央区日本橋3-14-10

使用期限

製造番号

MADE IN JAPAN

副作用被害救済制度  
電話 0120-149-931



01®登録商標 PE・金属 4 987107 629340

**124錠 ビタミンC主薬製剤 第3類医薬品**

**■用法・用量■**

次の量の水又はお湯で服用して下さい。

年齢	1回量	1日服用回数
成人(15歳以上)	2錠	2回
7歳以上15歳未満	1錠	朝晩服用して下さい。
7歳未満	服用しないで下さい。	

<用法・用量に関連する注意>

- 用法・用量を厳守して下さい。
- 食前・食後にかかわらず、服用していただけます。
- 7歳以上の子に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させて下さい。

**■成分・分量■**

本剤は、白色のフィルムコーティング錠で、4錠中に次の成分を含有しています。

アスコルビン酸(ビタミンC)..... 1000mg  
L-システイン..... 240mg  
コハク酸 $\alpha$ -トコフェロール  
(天然型ビタミンE)..... 100mg  
リボフラビン酪酸エステル  
(ビタミンB<sub>2</sub>酪酸エステル)..... 12mg  
ピリドキシン塩酸塩(ビタミンB<sub>6</sub>)..... 20mg  
ニコチン酸アミド(ビタミンB<sub>3</sub>)..... 25mg  
パントテン酸カルシウム..... 24mg  
添加物：トウモロコシデンプン、乳酸Ca、セルロース、クロスカルメロースNa、メタケイ酸アルミン酸Mg、ステアリン酸Mg、ヒプロメロース、酸化チタン、マクロゴール、カルナバウロウ  
<成分・分量に関連する注意>

- 本剤の服用により、尿及び便の検査値に影響を与えることがあります。医師の検査を受ける場合は、ビタミンCを含有する製剤を服用していることを医師に知らせて下さい。
- 本剤に配合されているリボフラビン酪酸エステル(ビタミンB<sub>2</sub>酪酸エステル)により、尿が黄色になることがあります。

**■保管及び取扱い上の注意**

- 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管して下さい。
- 小児の手の届かない所に保管して下さい。
- 他の容器に入れ替えないで下さい。(誤用の原因になったり品質が変わります)
- 品質保持のため、開封後は袋のチャックをきちんと閉めて保管して下さい。
- ぬれた手で取り扱わないで下さい。水分が錠剤につくと、表面が一部溶けて、変色又は色むらを生じることがあります。また、ぬれた錠剤を袋に戻すと他の錠剤にも影響を与えますので、戻さないで下さい。
- 袋の中に乾燥剤を入れてありますので、薬を使い終わるまでは捨てないで下さい。また、間違っても服用しないよう注意して下さい。
- 表示の使用期限を過ぎた製品は使用しないで下さい。

