

ここから引き切ってください

ここから引き切ってください

小林製薬の 医薬品

頑固なしみに\*。飲んで効く

# 【医薬品】 ケシミン LC錠プラス+

L-システイン  
240mg\*

ビタミンC  
1000mg\*



小林製薬

\*頑固なしみとは繰り返し現れるしみのことです。 ※1日量 しみ等の緩和

**成分・分量** 1日量(6錠)中:アスコルビン酸(ビタミンC)…1000mg、L-システイン…240mg、リボフラビン(ビタミンB<sub>2</sub>)…6mg、ピリドキシン塩酸塩(ビタミンB<sub>6</sub>)…12mg、コハク酸d-α-トコフェロール(天然型ビタミンE)…50mg  
添加物として、トウモロコシ澱粉、結晶セルロース、クロスカルメロースナトリウム、メタケイ酸アルミン酸マグネシウム、ステアリン酸マグネシウム、ヒプロメロース、酸化チタン、マクロゴール、カルナウバロウを含有する  
(成分・分量に関連する注意)●本剤の服用により、尿及び大便の検査値に影響を及ぼすことがありますので、これらの検査を受ける場合は、本剤を服用していることを医師にお知らせください●本剤の服用により尿が黄色くなる場合がありますが、これは本剤に含まれるリボフラビン(ビタミンB<sub>2</sub>)によるものですから心配ありません

イメージ図

第3類医薬品

原寸大  
30日分  
(15才以上)  
180錠



ここから引き切ってください

ここから引き切ってください

袋の開け方



ケシミンLC錠プラス 11090 申込番号  
お申し込みは 通話料 0120-64-9876  
(午前9:00~午後5:00/土、日、祝日除く)

服用に際して、この説明書きを必ずお読みください。使用期限(パウチ下部に記載)を過ぎた製品は服用しないこと。吸湿しやすいため、服用のつどチャックをしっかりと閉めること  
L-システイン配合 ビタミンC主薬製剤 **第3類医薬品** 販売名:ケシミンLC錠プラス

### 使用上の注意

**相談すること** 1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること  
(1) 医師の治療を受けている人 (2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人  
2. 服用後、右記の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、このパウチを持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること  
3. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、このパウチを持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること:下痢、便秘  
4. 1ヶ月位服用しても症状がよくならない場合は、服用を中止し、このパウチを持って医師、歯科医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること  
5. 服用後、生理が予定より早くきたり、経血量がやや多くなったりすることがある。出血が長く続く場合は、このパウチを持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	吐き気、嘔吐、胃部不快感、腹痛

**効能・効果** ●次の諸症状の緩和:しみ、そばかす、日やけ・かぶれによる色素沈着●次の場合の出血予防:歯ぐきからの出血、鼻血「ただし、これらの症状について、1ヶ月ほど使用しても改善がみられない場合は、医師、薬剤師又は歯科医師に相談すること。」  
●次の場合のビタミンCの補給:肉体的疲労時、妊娠・授乳期、病中病後の体力低下時、老年期

**用法・用量** 次の量を朝晩に水又はお湯で服用してください  
(用法・用量に関連する注意)(1)定められた用法・用量を厳守すること(2)小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させること

年齢	1回量	服用回数
大人(15才以上)	3錠	1日2回
7才以上15才未満	1錠	
7才未満	×	服用しないこと

**保管及び取扱い上の注意** (1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所にチャックをしっかりと閉めて保管すること(2)小児の手の届かない所に保管すること(3)他の容器に入れ替えないこと(誤用の原因になったり品質が変わる)(4)容器のチャックの閉め方が不十分な場合は、湿気などの影響により本剤が変質する恐れがあるので、服用後はそのつど必ずチャックをしっかりと閉めること(5)ぬれた手で触れないこと。水分が錠剤につくと、表面が一部溶けて、変色又は色むらを生じることがあります。また、ぬれた錠剤をパウチに戻すと他の錠剤にも影響を与えるので、戻さないこと(6)使用期限(パウチ下部に記載)を過ぎた製品は服用しないこと。なお期限内であっても、一度開封した後は、品質保持の点から開封日より6ヶ月以内に服用すること  
製品のお問合せは、右下のお客様相談室又はお申し込みの電話番号にお問い合わせください

副作用被害救済制度 ☎0120-149-931  
使用期限(西暦年/月)/製造番号

小林製薬株式会社  
〒541-0045 大阪市中央区道修町4-4-10  
製造販売元  
至誠堂製薬株式会社  
〒639-2241 奈良県御所市大字茅原 220-1  
販売元  
MADE IN JAPAN  
製品のご質問・ご相談は ☎0120-63-9876  
(午前9:00~午後5:00/土、日、祝日除く)  
オンラインショップ  
www.2.kobayashi.co.jp

10190107