

押し開ける

第3類
医薬品

ビタミンC主薬製剤 ビタミンC2000「CF」

【効能・効果】

1. 次の諸症状の緩和…しみ、そばかす、日やけ・かぶれによる色素沈着
 2. 次の場合の出血予防…歯ぐきからの出血、鼻出血
 3. 次の場合のビタミンCの補給…肉体疲労時、妊娠・授乳期、病中病後の体力低下時、老年期
- ※ただし、上記1及び2の症状について、1ヶ月ほど使用しても改善がみられない場合は、医師、薬剤師又は歯科医師に相談してください。

【用法・用量】

次の量を、食後に水又はお湯で、かまずに服用してください。

年齢	1回量	1日服用回数
成人(15歳以上)	1~3錠	2回
11歳以上15歳未満	1~2錠	
7歳以上11歳未満	1錠	
7歳未満	服用しないでください	

＜用法・用量に関連する注意＞

- (1) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとで服用させてください。
- (2) 用法・用量を厳守してください。

【特徴】

- 成人の1日最大服用量(6錠中)にビタミンCを2000mg、カルシウムを68mg含有しています。
- ナトリウムを含まないので塩分の取りすぎを気にせず服用できます。
- 小型で飲みやすい錠剤です。

製造販売元 **スバリ** 中央薬品株式会社
富山県富山市西四十物町4-9

【成分・分量】

6錠(成人の1日最大服用量)中に次の成分を含みます。

成分	含量
ビタミンCとして ビタミンC(アスコルビン酸) アスコルビン酸カルシウム(ビタミンCカルシウム塩) (ビタミンCを600mg含有)	2,000mg 1,400mg 726mg
リボフラビン酪酸エステル(ビタミンB2)	6mg

添加物: ヒプロメロース、ヒドロキシプロピルセルロース、セルロース、D-マンニトール、ステアリン酸Mg

＜成分・分量に関連する注意＞

- (1) 本剤の服用により尿が黄色くなる場合がありますが、ビタミンB2によるもので心配ありません。
- (2) 本剤の服用により、尿及び大便の検査値に影響を与える場合がありますので、医師の治療や検査を受ける場合は、本剤を服用していることを医師にお知らせください。

＜保管及び取り扱い上の注意＞

- (1) 高温を避け、直射日光の当たらない湿気の少ない涼しいところに密栓して保管してください。
- (2) 小児の手の届かないところに保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり、品質が変わることがあります。)
- (4) 使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。
- (5) 錠剤に水がついたり、ボトルのフタの閉め方が不十分な場合、湿気などの影響で、薬が変質することがありますので、ぬれた手で錠剤に触れないでください。また、服用のつど、フタをしっかりと閉めてください。
- (6) ボトルの中にある乾燥剤は、開封後も必ず入れたままにしておいてください。乾燥剤は、絶対に飲まないでください。
- (7) ボトルの中の詰め物は、輸送中の錠剤の破損を防止するために入れてありますので、フタを開けた後は捨ててください。
- (8) 一度開封した後は、品質保持の点から、開封日より6ヶ月以内を目安になるべくすみやかに服用してください。
- (9) 箱の「開封年月日」記入欄に、開封した日付をご記入ください。

V I T A M I N C2000

体力低下 しみ そばかすに ビタミンC

1日6錠で 2000mg

330錠
55日分

＜ナトリウムフリー＞

この箱の記載事項は、服用前に必ずお読みください。
また、必要なときに読めるよう本剤を入れて保管してください。

⚠ 使用上の注意

■ 相談すること

1. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症状
消化器	はきけ・嘔吐、胃部不快感、胃部膨満感、食欲不振
皮膚	発疹・発赤・かゆみ

2. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
3. 1ヵ月位服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この箱を持って医師、歯科医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

商品に関する
ご相談窓口

中央薬品株式会社
☎ 076-493-5010
受付時間: 9時~17時(土・日・祝日を除く)

副作用被害救済制度
電話: 0120-149-931(フリーダイヤル)



キャップ: PP
ボトル: PE
詰め物: PE
紙 外箱: 紙
包装: 330錠