



切り取り線 ✂

開封後はチャックを閉じて保存してください。

服用に際して、この説明文書を必ずお読みください。

180錠

**fracora** L-システイン配合 ビタミンC主薬製剤  
販売名: シスプライトLC

第3類医薬品

**!** 使用上の注意

**!** 相談すること

- 服用後、右記の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師または登録販売者にご相談ください。
- 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続または増強がみられた場合には、服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師または登録販売者にご相談ください。: 下痢
- 1ヵ月位服用しても症状が良くならない場合は服用を中止し、この製品を持って医師、歯科医師、薬剤師または登録販売者にご相談ください。

関係部位	症 状
消化器	吐き気・嘔吐

**(効能・効果)**

- 次の諸症状の緩和: しみ、そばかす、日やけ・かぶれによる色素沈着
- 次の場合の出血予防: 歯ぐきからの出血、鼻出血  
[ただし、これらの症状について、1ヵ月ほど使用しても改善がみられない場合は、医師、薬剤師または歯科医師にご相談ください。]
- 次の場合のビタミンCの補給: 肉体的疲労時、妊娠・授乳期、病中病後の体力低下時、老年期

**(成分・分量) 1日量(6錠)中**

アスコルビン酸カルシウム847.28mg(ビタミンCとして700mg)、L-システイン160mg、ピロドキシン塩酸塩(ビタミンB6)30mg、d-α-トコフェロール(天然ビタミンE)20mg、リポフラボン(ビタミンB2)12mg  
※添加物として、無水クイ酸、ヒドロキシプロピルセルロース、ステアリン酸Mg、セルロース、ヒプロメロース、ポリオキシエチレンポリオキシプロピレングリコール、白糖、タルク、アラビアゴム、酸化チタン、カルナウバワロウを含有する。

**(用法・用量)**

次の量を、水またはぬるま湯にて服用してください。

年 齢	1回量	1日服用回数
大人(15歳以上)	2錠	2~3回
7歳以上15歳未満	1錠	
7歳未満	服用しないこと	

ただし、1日2回服用する場合は朝夕、1日3回服用する場合は朝昼晩に服用してください。

**(成分・分量)に関連する注意)**

1. 本剤に含まれるビタミンB2により尿が黄色くなることがあります。
2. 本剤に含まれるビタミンCにより尿及び大便の検査値に影響を与えることがあるので、医師の診察を受ける場合は、本剤を服用していることを医師に伝えてください。

**(用法・用量)に関連する注意)**

1. 用法・用量を厳守してください。
2. 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。
3. 1日服用回数は、症状に合わせてご調節ください。

**(保管・取扱い上の注意)**

1. 直射日光のあたらない涼しいところに密封して保管してください。
2. 小児の手の届かないところに保管してください。
3. 他の容器に入れ替えないでください(誤用の原因や品質が変わる恐れがあります)。
4. 本剤にぬれた手で触れないでください。
5. 品質保持のため手に触れた錠剤は袋に戻さないでください。
6. 使用期限の過ぎた製品は服用しないでください。

販売元 **株式会社 協和**  
東京都新宿区西新宿1-22-2  
FACORA CHUO-HINAGI BLDG.  
TEL 0120-57-2020  
http://www.fracora.com

製造販売元 **中村薬品工業株式会社**  
奈良県高市郡高取町丹生31-32

製造番号

使用期限



副作用被害救済制度 電話0120-149-9311

MADE IN JAPAN SE01