

服用に際して、この添付文書を必ずお読みください
また必要なときに読めるよう大切に保管してください
使用期限(パッケージ側面及びピンラベルに記載)を過ぎた製品は服用しないこと



販売名：ケシミンLC錠a

L-システイン、ビタミンC製剤 第3類医薬品

製品特徴

1. L-システインとビタミンCが協力して、しみ、そばかすの原因となるメラニンの生成を抑え、排出を促します
2. ビタミンB₂、ビタミンEが皮ふの新陳代謝(ターンオーバー)を活発にして、メラニンを排出します
3. しみ、そばかすを緩和し、キレイな肌を取り戻していきます

⚠ 使用上の注意



相談すること

1. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症 状
消化器	吐き気・嘔吐、腹痛

2. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
下痢
3. 1ヶ月位服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この文書を持って医師、歯科医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

(裏面につづく)

効能・効果

- 次の諸症状の緩和：しみ、そばかす、日やけ・かぶれによる色素沈着
- 次の場合の出血予防：歯ぐきからの出血、鼻出血
「ただし、これらの症状について、1ヶ月ほど使用しても改善がみられない場合は、医師、薬剤師又は歯科医師に相談すること。」
- 次の場合のビタミンCの補給：肉体疲労時、妊娠・授乳期、病中病後の体力低下時、老年期

用法・用量 次の量を食後に水又はお湯で服用してください

年 齢	1回量	服用回数
大人(15才以上)	2錠	1日3回
7才以上15才未満	1錠	1日3回
7才未満	× 服用しないこと	

<用法・用量に関連する注意>

- (1) 定められた用法・用量を厳守すること
- (2) 吸湿しやすいため、服用のつどキャップをしっかりとしめること
- (3) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させること

成分・分量 1日量(6錠)中

成 分	分 量	はたらき
アスコルビン酸(ビタミンC)	600mg	メラニン色素の生成を抑制して皮ふの色素沈着を緩和し、黒色メラニンの脱色化を促進する皮ふや粘膜などの細胞組織を正常に保つ
L-システイン	240mg	皮ふの新陳代謝を活発にしてビタミンCの働きを助け、メラニンの排出を促進する
コハク酸d- α -トコフェロール(ビタミンEコハク酸エステル)	50mg	皮ふの血行を促進する新陳代謝を活発にしてメラニンの排出を促進する
リボフラビン酪酸エステル(ビタミンB ₂ 酪酸エステル)	12mg	脂質の代謝を助けることで皮ふの代謝(ターンオーバー)を正常化する

添加物として、セルロース、トウモロコシデンプン、乳糖、ヒドロキシプロピルセルロース、無水ケイ酸、ステアリン酸Mg、ヒプロメロース、白糖、タルク、酸化チタン、アラビアゴム、ポビドン、カルナバウロウを含有する

<成分・分量に関連する注意>

- リボフラビン酪酸エステルにより尿が黄色くなることがありますが、心配ありません
- 尿及び便の検査値に影響を与えることがあります
医師の検査を受ける場合は、ビタミンCを含有する製剤を服用していることを医師に知らせてください


保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管すること
- (2) 小児の手の届かない所に保管すること
- (3) 他の容器に入れ替えないこと(誤用の原因になったり品質が変わる)
- (4) 本剤をぬれた手で扱わないこと
- (5) ビンの中の詰め物は輸送時の破損防止用なので開封時に捨てること
- (6) 乾燥剤は服用しないこと

製品のご質問・
ご相談は **0120-63-9876**
通話料
無 料
午前9:00~午後5:00/土、日、祝日除く

オンラインショップ www2.kobayashi.co.jp

製品のお問合せは、左記のお客相談室又は
お申し込みの電話番号をお願いいたします

発売元
 **小林製薬株式会社**
〒541-0045 大阪市中央区道修町4-410

製造販売元
皇漢堂製薬株式会社
〒660-0803 兵庫県尼崎市長洲本通2-8-27

10120565
MADE IN JAPAN