

服用に際して、必ずこの説明文書をお読みください。
また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

ビタミンC主薬製剤

しみ、そばかすに

シスビタン® 〈軟カプセル〉

◆**シスビタン**®は、ビタミンCを主剤とし、L-システインと天然ビタミンEを配合したのみやすい小型のソフトカプセル剤です。

過剰なメラニンの生成を抑制し、またメラニンの排泄を促進することにより、しみ、そばかす、日やけなどの色素沈着を緩和します。



使用上の注意



相談すること

1. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるため、直ちに服用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	吐き気・嘔吐

2. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

下痢

3. 1ヵ月位服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この説明文書を持って医師、歯科医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
4. 服用後、生理が予定より早くきたり、経血量がやや多くなったりすることがあります。出血が長く続く場合は、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

効 能 ・ 効 果

次の諸症状の緩和：しみ、そばかす、日やけ・かぶれによる色素沈着

次の場合の出血予防：歯ぐきからの出血、鼻出血

「ただし、これらの症状について、1ヵ月ほど使用しても改善がみられない場合は、医師、薬剤師又は歯科医師に相談すること。」

次の場合のビタミンCの補給：肉体疲労時、妊娠・授乳期、病中病後の体力低下時、老年期

用 法 ・ 用 量

次の1回量を1日3回、食前または食後に水またはお湯で服用してください。

年 齢	1 回 量	1 日服用回数
成人（15才以上）	2カプセル	3回
7才以上 15才未満	1カプセル	
7才未満	服用しないこと	

〈用法・用量に関連する注意〉

- (1) 定められた用法・用量をお守りください。
- (2) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。

裏面もお読みください。

成分・分量

1日量（6カプセル）中

成分	含量	はたらき
L-システイン	240mg	皮膚の新陳代謝を活発にし、メラニンの排泄を促進し、色素沈着を緩和します。
アスコルビン酸 (ビタミンC)	300mg	メラニンの生成を抑制し、色素沈着を緩和します。
d- α -トコフェロール (天然ビタミンE)	100mg	末梢の血行を良くし、色素沈着の緩和を助けます。

添加剤：クロスポビドン、グリセリン脂肪酸エステル、サラシミツロウ、中鎖脂肪酸トリグリセリド、コハク化ゼラチン、グリセリン、カラメル、酸化チタン、赤色102号 含有

〈成分・分量に関連する注意〉

本剤は尿および大便の検査値に影響をおよぼすことがありますので、尿および大便の検査を受ける場合には本剤を服用していることを医師にお知らせください。

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。
(誤用の原因になったり品質が変わるおそれがあります。)
- (4) 使用期限を過ぎた製品は、服用しないでください。

お問い合わせ先 株式会社 富士薬品（学術室）
電話（048）648-1118 9：00～17：30（土、日、祝日を除く）

製造販売元 **株式会社 富士薬品**
埼玉県さいたま市大宮区桜木町4丁目383番地