



**ビタミンC「ケンエー」 第3類医薬品**

**使用上の注意**

相換すること  
1. 次の場合は、直ちに服用を中止し、この外箱を持って医師、  
歯科医師又は薬剤師に相談してください。

(1)服用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症状
消化器	悪心・嘔吐

(2)1ヶ月位服用しても症状がよくならない場合  
2. 次の症状があらわれることがあるので、このような症状の継続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、医師又は薬剤師に相談してください。

【効能効果】  
○ 次の諸症状の緩和：  
しみ、そばかす、日焼け・かぶれによる色素沈着

○ 次の場合の出血予防：  
歯ぐきからの出血、鼻出血

【用法用量】  
「ただし、これらの症状について、1ヶ月ほど使用しても改善がみられない場合は、医師、薬剤師又は歯科医師に相談してください。」  
○ 次の場合のビタミンCの補給：  
肉体疲労時、妊娠・授乳期、病中病後の体力低下時、老年期

【用法用量】  
15歳以上 1回1包  
11歳以上15歳未満 1回2/3包  
7歳以上11歳未満 1回1/2包  
3歳以上7歳未満 1回1/3包  
1歳以上3歳未満 1回1/4包  
いずれも1日2～3回食後に服用してください。

【用法用量に関連する注意】  
(1)小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。

(2)定められた用法用量を厳守してください。  
(3)本剤は、1歳未満の乳児には服用させないでください。

【成分量】  
本品1包(0.6g)中 日局 アスコルビン酸 0.6g含有。

【成分量に関連する注意】  
本剤の服用により、尿及び大便の検査値に影響をおよぼすことがありますので、これらの検査を受ける場合は、本剤を服用していることを医師にお知らせください。

**【保管及び取扱い上の注意】**

- (1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2)小児の手の届かない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れかえないでください。(誤用の原因になり品質が変わることがあります。)
- (4)1包を分割した残りを服用する場合には、袋の口を折り返して保管し、2日以内に服用してください。
- (5)使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。

副作用被害救済制度の問合せ先  
(独)医薬品医療機器総合機構  
<http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai.html>  
電話 0120-149-931(フリーダイヤル)

**健栄製薬株式会社**  
大阪府中央区伏見町2丁目5番8号  
電話番号 06(6231)5626

**第3類医薬品**

ビタミンC剤  
**ビタミンC**  
0.6g×60包 原末



**0.6g×60包 第3類医薬品**

ビタミンC剤  
**ビタミンC**  
「ケンエー」  
原末

日本薬局方 アスコルビン酸

VITAMIN C [KENEI]

**第3類医薬品**

ビタミンC剤  
**ビタミンC**  
ケンエー  
原末

紙 箱 分包装: PE金属

0.6g×60包