

しみ、そばかす、日やけによる色素沈着

VITAMIN



日本薬局方ビタミンC

原末



ビタミンC
アスコルビン酸K
第3類医薬品

[用法・用量]

次の量を、水又はぬるま湯で服用してください。

年齢	成人(15才以上)	7才~14才
1回量	1g(2杯)	0.5g(1杯)
服用回数	1日1~2回服用してください。ただし、服用間隔は4時間以上おいてください。(添付のスプーンにて量り服用してください。なお、スプーン1杯が0.5gです。)	

<用法・用量に関連する注意>

- (1)用法・用量を厳守してください。
- (2)7才未満は服用しないでください。
- (3)小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。

[効能]

- 次の諸症状の緩和:しみ、そばかす、日やけ・かぶれによる色素沈着
- 次の場合の出血予防:歯ぐきからの出血、鼻出血「ただし、これらの症状について、1ヶ月ほど使用しても改善がみられない場合は、医師、薬剤師又は歯科医師に相談してください。」
- 次の場合のビタミンCの補給:肉体疲労時、妊娠・授乳期、病中病後の体力低下時、老年期

[成分]

1日量(2g)中
アスコルビン酸(ビタミンC)…2000mg
添加物を含んでおりません。

<成分に関連する注意>

本剤は尿及び大便の検査値に影響を及ぼすことがありますので、尿及び大便の検査を受ける場合は、本剤を服用していることを医師にお知らせください。

製造販売元 小林薬品工業株式会社
岐阜県岐阜市中鶴1丁目139番地

小林薬品工業株式会社 お客様相談室

電話:058-278-3933

受付時間:10時~16時(土、日、祝日を除く)

副作用被害救済制度 ☎ 0120-149-931

ご使用に際して、外箱の説明文を必ずお読みください。また、必要な時に読めるよう商品と共に大切に保管してください。

⚠ 使用上の注意

■ 相談すること

1. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この外箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症 状
消化器	吐き気・嘔吐

2. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この外箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

下痢
3. 1ヶ月位服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この外箱を持って医師、歯科医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

[保管及び取扱い上の注意]

- (1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2)小児の手の届かない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れ替えないでください(誤用の原因になります。)。
- (4)一度開封した後は、品質の保持の点から次の点にご注意ください。
 - 1)本剤は、湿気の影響を受けやすいので、水滴などを誤ってビンに入れないでください。
 - 2)ビンのフタのしめ方が不十分な場合、湿気などの影響で薬が変質することがありますので、服用のつどビンのフタをよくしめてください。
- (5)使用期限をすぎた製品は服用しないでください。