

第3類医薬品

しみ・そばかす
日焼けによる色素沈着に

ビタミンC

1日6錠で2000mgの
ビタミンC配合



VITAMIN

C2000 +B2

ナトリウムフリー・シュガーフリー

アスコルビン酸カルシウム配合

服用に際しては、この説明文を必ずお読みください。

【使用上の注意】 相談すること

- 1.服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性がある
ので、直ちに服用を中止し、このケースを持って医師、薬剤師
または登録販売者に相談してください。

関係部位	症状
消化器	吐き気・嘔吐

- 2.服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状
の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、このケースを
持って医師、薬剤師または登録販売者に相談してください。▶下痢
- 3.1ヵ月位服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、
このケースを持って医師、歯科医師、薬剤師または登録販売者
に相談してください。

【効能・効果】

- 1.次の諸症状の緩和：しみ、そばかす、日やけ・かぶれによる色素沈着
- 2.次の場合の出血予防：歯ぐきからの出血、鼻出血
「ただし、上記1および2の症状について、1ヵ月ほど使用しても改善がみ
られない場合は、医師、薬剤師または歯科医師に相談してください。」
- 3.次の場合のビタミンCの補給：肉体疲労時、妊娠・授乳期、病中
病後の体力低下時、老年期

【用法・用量】

次の量を、食後に水またはお湯で、かまずに服用してください。

年齢	1回量	1日服用回数
成人(15歳以上)	1～3錠	2回
11歳以上15歳未満	1～2錠	
7歳以上11歳未満	1錠	
7歳未満	服用しないこと	

〈用法・用量に関する注意〉①定められた用法・用量を厳守してく
ださい。②小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のも
とに服用させてください。

【成分・分量】6錠中

ビタミンCとして……………2,000mg
 {アスコルビン酸……………1,400mg
 {アスコルビン酸カルシウム(アスコルビン酸として600mg含有) 726mg
 リボフラビン酪酸エステル(ビタミンB2酪酸エステル)……………6mg
 ※添加物として、部分アルファー化デンプン、D-マンニトール、エチ
 ルセルロース、セルロース、ステアリン酸Mg、ヒプロメロースを
 含有します。

〈成分に関する注意〉①本剤の服用により尿が黄色くなること
がありますが、リボフラビン酪酸エステルによるものですので心配
ありません。②本剤の服用により尿および大便の検査値に影響
を与えることがありますので、医師の治療を受ける場合は、本剤
を服用していることを医師にお知らせください。

副作用被害 (独)医薬品医療機器総合機構
 救済制度の http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai.html
 お問合せ先 電話 0120-149-931 (フリーダイヤル)

VC04SC04P

第3類医薬品

病中
病後の 肉体疲労時
体力低下時に

ビタミンC

1日6錠で2000mgの
ビタミンC配合

VITAMIN

C2000 +B2

ナトリウムフリー・シュガーフリー

アスコルビン酸カルシウム配合

押し開ける

ビタミンC主薬製剤

- ビタミンCは体内では生成されず、毎日の食事や医薬品などで摂取することが欠かせない栄養素です。
- 本剤はビタミンC (アスコルビン酸・アスコルビン酸カルシウム) にビタミンB2を配合しています。
- 成人の1日最大服用量(6錠中)にビタミンCを2,000mg含有しています。
- アスコルビン酸ナトリウムは含まれておりません。塩分のとりすぎを気にせずに服用いただけます。
- 小型で飲みやすい錠剤です。

第3類医薬品

【保管及び取扱い上の注意】

1. 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。
2. 小児の手の届かない所に保管してください。
3. 他の容器に入れ替えないでください。誤用や、品質が変わる原因になることがあります。
4. 本剤をぬれた手で扱わないでください。ぬれた手で扱うと変色することがあります。また、服用のつどフタをしっかりと閉めてください。
5. ボトルの中の詰め物は、輸送中に錠剤が破損するのを防ぐためのものです。開封後は不要となりますので取り除いてください。詰め物を再びボトルに入れると、湿気を含み、錠剤の品質が変わる原因になることがあります。
6. ボトルの中の小袋は乾燥剤ですので絶対に飲まないでください。また開封後も必ず乾燥剤を入れたままにしてください。
7. まれに錠剤に斑点がみられる場合がありますが、本剤の成分によるものですので、品質上は問題ありません。
8. 使用期限をすぎた製品は服用しないでください。
9. 箱の「開封年月日」記入欄に、開封した日付を記入してください。一度開封した製品は、品質保持の点から、開封日より6ヵ月以内を目安になるべくすみやかに服用してください。

販売名: ファイミンC2000

SP

製造販売元 株式会社サイキョウ・ファーマ

東京都江東区亀戸5-6-21 www.saikyo-pharma.co.jp

お客様相談窓口

(受付・平日10:00~17:00)

0120-456-787

E-Mail: info@saikyo-pharma.co.jp

※この医薬品は「中国」の提携工場で製造された輸入品で、日本の医薬品医療機器等法に基づき出荷前に日本国内にて試験・検査されております。