

※2017年9月（新規制定年月）

ご使用に際して、この説明文書を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

しみ、そばかす、日やけ・かぶれによる色素沈着に

第3類医薬品

ビタミンC主薬製剤

VCピュア2000

製品の特徴

- ビタミンCが1日量で2000mg補給できます。
- 水なしで飲めるチュアブルタイプです。



使用上の注意



相談すること

- 1.服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性がありますので、直ちに服用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症 状
消 化 器	吐き気・嘔吐

- 2.服用後、次の症状があらわれることがありますので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
下痢
- 3.1ヵ月位服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この説明文書を持って医師、歯科医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

効能・効果

- 次の諸症状の緩和：しみ、そばかす、日やけ・かぶれによる色素沈着
- 次の場合の出血予防：歯ぐきからの出血、鼻出血
「ただし、これらの症状について、1ヵ月ほど使用しても改善がみられない場合は、医師、薬剤師又は歯科医師に相談してください。」
- 次の場合のビタミンCの補給：肉体疲労時、妊娠・授乳期、病中病後の体力低下時、老年期

用法・用量

次の量を、1日2回服用する場合は朝夕、1日3回服用する場合は朝昼晩、口の中でとがすか、又はかみくだいて服用してください。

年 齢	1 回 量	1日服用回数
大人（15歳以上）	4錠	2回（朝夕） ） 3回（朝昼晩）
11歳以上15歳未満	2 1/2錠	
7歳以上11歳未満	2錠	
5歳以上 7歳未満	1錠	
5歳未満	服用しないでください	

裏面もお読みください。

<用法・用量に関連する注意>

- (1)用法・用量を厳守してください。
- (2)小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。

成分・分量

12錠中

成分	含量
アスコルビン酸（ビタミンC）	1000mg
L-アスコルビン酸ナトリウム （アスコルビン酸として）	1124.7mg 1000mg
リボフラビン（ビタミンB ₂ ）	4mg

添加物：白糖、部分アルファー化デンプン、乳糖、サッカリンNa、CMC-Ca、ヒドロキシプロピルセルロース、ステアリン酸Mg

<成分・分量に関連する注意>

本剤の服用により、尿及び大便の検査値に影響を与えることがあります。尿及び大便の検査を受ける場合は、ビタミンCを含有する製剤を服用していることを医師にお知らせください。

保管及び取扱い上の注意

1. 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。
2. 小児の手の届かない所に保管してください。
3. 他の容器に入れ替えないでください（誤用の原因になったり品質が変わります）。
4. 使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。
5. 箱の「開封年月日」記入欄に開封した日付を記入してください。

副作用被害救済制度

☎0120-149-931

お問い合わせ先

株式会社 ドクターシーラボ 医薬品相談窓口

☎0120-888-647 受付時間10:00～17:00(土・日・祝日を除く)

発 売 元 **株式会社 ドクターシーラボ**
埼玉県川口市西立野大宝68-2

製造販売元 **大和製薬株式会社**
富山県富山市水橋二杉1-2