

第3類医薬品

330錠入
(55日分)

1日6錠で2000mg

ビタミンC 2000

しみ そばかす 日焼けによる
色素沈着

実物大	年齢	1回量	服用回数
	15歳以上	1回1~3錠	1日2回 食後
	11~14歳	1回1~2錠	
	7~10歳	1回1錠	

第3類医薬品

330錠入
(55日分)

1日6錠で2000mg

ビタミンC 2000

しみ そばかす 日焼けによる
色素沈着



実物大

+B2

アスコルビン酸カルシウム配合

シュガーフリー

ボトルの中の詰め物は
錠剤の破損防止用です。
開封時に捨ててください。

服用に際しては、この説明文を必ずお読みください。

【使用上の注意】 相関すること

1. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、このケースを持って医師、薬剤師または登録販売者に相談してください。

関係部位	症状
消化器	吐き気・嘔吐

2. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、このケースを持って医師、薬剤師または登録販売者に相談してください。▶下痢

3. 1ヵ月位服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、このケースを持って医師、歯科医師、薬剤師または登録販売者に相談してください。

【効能・効果】

1. 次の諸症状の緩和・しみ、そばかす、日やけ・かぶれによる色素沈着

2. 次の場合の出血予防：歯ぐきからの出血、鼻出血
「ただし、上記1および2の症状について、1ヵ月ほど使用しても改善が見られない場合は、医師、薬剤師または歯科医師に相談してください。」

3. 次の場合のビタミンCの補給：肉体的疲労時、妊娠・授乳期、病中病後の体力低下時、老年期

【用法・用量】

次の量を、食後に水またはお湯で、かますに服用してください。

年齢	1回量	1日服用回数
成人(15歳以上)	1～3錠	2回
11歳以上15歳未満	1～2錠	
7歳以上11歳未満	1錠	
7歳未満	服用しないこと	

〈用法・用量に関する注意〉①定められた用法・用量を厳守してください。②小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。

【成分・分量】6錠中

ビタミンCとして……………2,000mg
 {アスコルビン酸……………1,400mg
 アスコルビン酸カルシウム(アスコルビン酸として600mg含有) 726mg
 リボフラビン酸エステル(ビタミンB2酸エステル)……………6mg
 ※添加物として、部分アルファー化デンプン、D-マンニトール、エチルセルロース、セルロース、ステアリン酸Mg、ヒプロメロースを含有します。

〈成分に関する注意〉①本剤の服用により尿が黄色くなる場合がありますが、リボフラビン酸エステルによるものですので心配ありません。②本剤の服用により尿および大便の検査値に影響を与えることがありますので、医師の治療を受ける場合は、本剤を服用していることを医師にお知らせください。

副作用被害 (独)医薬品医療機器総合機構
 救済制度の http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai.html
 お問い合わせ先 電話 0120-149-931 (フリーダイヤル)



押し開ける



シュガーフリー

- ビタミンC主薬製剤**
- ビタミンCは体内では生成されず、毎日の食事や医薬品などで摂取することが欠かせない栄養素です。
 - 本剤はビタミンC(アスコルビン酸・アスコルビン酸カルシウム)にビタミンB2を配合しています。
 - 成人の1日最大服用量(6錠中)にビタミンCを2,000mg含有しています。
 - アスコルビン酸ナトリウムは含まれておりません。塩分のとりすぎを気にせずに服用いただけます。
 - 小型で飲みやすい錠剤です。

第3類医薬品

【保管及び取扱い上の注意】

1. 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。
2. 小児の手の届かない所に保管してください。
3. 他の容器に入れ替えないでください。誤用や、品質が変わる原因になることがあります。
4. 本剤をぬれた手で扱わないでください。ぬれた手で扱うと変色することがあります。また、服用つづつタをしっかりと開けてください。
5. ボトルの中の詰め物は、輸送中に錠剤が破損するのを防ぐためのもので、開封後は不要となりますので取り除いてください。詰め物を再びボトルに入ると、湿気を含み、錠剤の品質が変わる原因になることがあります。
6. ボトルの中の小袋は乾燥剤ですので絶対に飲まないでください。また開封後も必ず乾燥剤を入れたままにしてください。
7. まれに錠剤に斑点がみられる場合がありますが、本剤の成分によるものですので、品質上は問題ありません。
8. 使用期限をすぎた製品は服用しないでください。
9. 箱の「開封年月日」記入欄に、開封した日付を記入してください。一度開封した製品は、品質保持の点から、開封日より6ヵ月以内を目安にするべくすみやかに服用してください。



販売名：ビタミンC錠2000「SP」

製造販売元(輸入元)
株式会社サイキョウ・ファーマ

東京都江東区亀戸5丁目6番21号 www.saikyo-pharma.co.jp

お客様相談窓口
 (受付: 平日10:00~17:00)

0120-456-787

E-Mail: info@saikyo-pharma.co.jp