

この添付文書は服用前に必ずお読み下さい。また、必要なときに読めるよう大切に保存してください。

第3類医薬品

ビタミンC主薬製剤

カラシミンC顆粒(分包)

【使用上の注意】



相談すること

1. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この添付文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。

関係部位	症状
消化器	吐き気・嘔吐

2. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この添付文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。

下痢

3. 1ヶ月位服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この添付文書を持って医師、歯科医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。

【効能・効果】

○次の諸症状の緩和：しみ、そばかす、日やけ・かぶれによる色素沈着

○次の場合の出血予防：歯ぐきからの出血、鼻出血

「ただし、これらの症状について、1ヵ月ほど使用しても改善がみられない場合は、医師、薬剤師又は歯科医師に相談すること。」

○次の場合のビタミンCの補給：

肉体疲労時、妊娠・授乳期、病中病後の体力低下時、老年期

【用法・用量】

	1回服用量	1日服用回数
成人（15歳以上）	1包	2～3回
11歳以上15歳未満	2/3包	
7歳以上11歳未満	1/2包	
3歳以上7歳未満	1/3包	
1歳以上3歳未満	1/4包	
1歳未満	服用させないこと	

<用法・用量に関連する注意>

- 1) 定められた用法・用量を守ること。
- 2) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させること。

【成分分量】 3包（成人の1日最大服用量）中

アスコルビン酸（ビタミンC）……………750.0mg
リボフラビン（ビタミンB₂）……………3.0mg
パントテン酸カルシウム……………19.5mg
添加物：香料、ヒドロキシプロピルセルロース、粉末還元麦芽糖水アメ

<成分分量に関連する注意>

- 1) 本剤の服用により、尿及び大便の検査値に影響を与えることがある。医師の治療を受ける場合は、ビタミンCを含有する製剤を服用していることを医師に知らせること。
- 2) リボフラビンにより尿が黄色になることがあります。が、心配いりません。

【保管及び取扱い上の注意】

- 1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管すること。
- 2) 小児の手の届かない所に保管すること。
- 3) 誤用を避け、品質を保持するため、他の容器に入れ替えないこと。
- 4) 1包を分割した残りを保管する場合には袋の口を折り返して保管し、2日以内に使用すること。
- 5) 使用期限を過ぎた製品は使用しないこと。

【包装】

1包（1g）×90包

【お問い合わせ先】

鶴原製薬株式会社 医薬情報部
(9～17時、月～金：祝日を除く)
TEL 072-761-1456 (代表)



製造販売元
鶴原製薬株式会社
大阪府池田市豊島北1丁目16番1号