

この説明書は、本剤を服用する前に必ずよくお読みください。
また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

2013年9月(記載要領変更に伴う改訂)

第②類医薬品

B1

骨と歯の発育不良に
ビタミンADの補給(発育期、老年期など)

ユーラックミン®ソフトCA

ビタミンAD剤

特 徴

1. 本剤は健康な骨や歯を作るために必要なカルシウム、ビタミンA、ビタミンDをバランス良く配合したお薬です。また、抗酸化作用により細胞の正常な働きを助けるビタミンEを配合しています。
2. ラグビーボール型の小さく飲みやすいソフトカプセル剤です。



使用上の注意



相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
(1)医師の治療を受けている人
(2)妊娠3ヵ月以内の妊婦、妊娠していると思われる人又は妊娠を希望する人
(妊娠3ヵ月前から妊娠3ヵ月までの間にビタミンAを1日10,000国際単位以上摂取した妊婦から生まれた児に先天異常の割合が上昇したとの報告があります。)
2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性がありますので、直ちに服用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症 状
皮 膚	かゆみ、発疹・発赤
消 化 器	吐き気・嘔吐

3. 服用後、次の症状があらわれることがありますので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
下痢、便秘
4. 1ヵ月位服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

—裏面も必ずお読みください—

効能又は効果

- 骨歯の発育不良
- 次の場合のビタミンADの補給：
妊娠・授乳期、病中病後の体力低下時、発育期、老年期
- くる病の予防
- 次の症状の緩和：目の乾燥感
- 夜盲症（とり目）

用法及び用量

次の1回服用量を1日1回、なるべく空腹時をさせて、水又は白湯で服用してください。

年 齢	1 回 服 用 量
成人（15歳以上）	1回2カプセル
5歳以上15歳未満	1回1カプセル
5歳未満	服用しないでください

〈用法及び用量に関連する注意〉

- (1)定められた用法・用量をお守りください。
- (2)小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。

成分及び分量

2カプセル（1日量）中

成 分	分 量	働 き
乳酸カルシウム水和物	340mg	骨や歯の形成に必要なミネラルです。
ビタミンA油 （ビタミンAとして）	4mg (4,000国際単位)	皮膚や粘膜の正常な働きを助けるビタミンです。 また、目の乾燥感を緩和します。
コレカルシフェロール （ビタミンD ₃ として）	10 μ g (400国際単位)	腸管でカルシウムの吸収を促進し、骨、歯へのカルシウム沈着（供給）を助けるビタミンです。
酢酸d- α -トコフェロール （ビタミンE）	14mg	抗酸化作用により体内の脂質を酸化から守り、細胞の正常な働きを助けるビタミンです。

※添加物として、グリセリン脂肪酸エステル、中鎖脂肪酸トリグリセリド、コハク化ゼラチン、ゼラチン、グリセリン、酸化チタンを含有します。

保管及び取扱い上の注意

- (1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2)水分がカプセルに付きますと内容成分の変化の原因となりますので、誤って水滴を落としたり、ぬれた手で触れないでください。
- (3)小児の手のとどかない所に保管してください。
- (4)誤用をさけ、品質を保持するため、他の容器に入れかえないでください。
- (5)使用期限（外箱及び容器に記載）を過ぎた製品は服用しないでください。

製品についてのお問い合わせ

- ・お買い求めの販売店
- ・ジャパンメディック株式会社 お客様相談窓口：076-438-1107
〔受付時間：月～金（祝祭日・年末年始を除く）9:00～17:00〕

副作用被害救済制度の問合せ先
（独）医薬品医療機器総合機構
<http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai.html>
電話 0120-149-931（フリーダイヤル）

製造販売元

ジャパンメディック株式会社
富山県富山市横越168