

ご使用に際して、以下の注意書きをよくお読み下さい。

肌あれ、にきび、口内炎、疲れに

第3類医薬品

販売名 **マスチゲン®BBゼリー**

水なしで
かんで服用

コラーゲンづくり等を助ける4つのビタミン配合により、肌あれ・にきび・口内炎を内側から治します。ゼリーの錠剤ですから、水なしで、かんで服用できます。職場や学校でも手軽に服用していただける苦味のないグレープフルーツ味。低カロリー。

特長 1.水あめやカンテンを原料とした、ゼリーでつくった錠剤ですから、水なしで、かんで服用できます。2.普通の錠剤を飲み込むのが苦手な方でも服用が簡単です。3.お肌の真皮層を形成するコラーゲンづくりを助けるビタミンC、お肌や粘膜を正常な状態に保つビタミンB2・ビタミンB6配合により、肌あれ・にきび・口内炎を内側から治します。4.疲れの栄養補給にも効果的です。

使用上の注意

相談すること 1.服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この容器を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。

関係部位	症状
消化器	胃部不快感、胃部膨満感、食欲不振、吐き気・嘔吐

2.服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この容器を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。下痢 3.1ヵ月位服用しても症状がよくなるない場合は服用を中止し、この容器を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。

【効能】 次の諸症状の緩和：肌あれ、にきび、口内炎、口角炎、口唇炎、かぶれ、ただれ、湿疹、皮膚炎、舌炎、赤鼻、目の充血、目のかゆみ「ただし、これらの症状について、1ヵ月ほど使用しても改善がみられない場合は、医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。」
次の場合のビタミンB2の補給： 肉体疲労時、病中病後の体力低下時、妊娠・授乳期

【用法・用量】 7歳以上15歳未満 1回1錠を1日2回(1日分7.5キロカロリー)、15歳以上 1回2錠を1日2回(1日分15キロカロリー)、朝夕にかんで服用して下さい。
<用法・用量に関連する注意> 1.かんで服用して下さい。 2.定められた用法・用量をお守り下さい。 3.小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させて下さい。

【成分・分量】 成人1日量4錠中 ビタミンC180mg、ビタミンB2酪酸エステル20mg、ビタミンB612mg、ニコチン酸アミド(ビタミンの一種)40mg 添加物として水アメ、カンテン、白糖、ペクチン、エリスリトール、トコフェロール酢酸エステル、ポリソルベート80、香料、その他2成分を含みます。本剤の服用により、尿が黄色くなることがあります。配合されているビタミンB2の一部が尿中に排泄されるため心配はありません。

【保管及び取扱い上の注意】 1.錠剤を缶から取り出したらすぐに服用して下さい。2.直射日光の当たらない涼しい所にフタを閉めて保管して下さい。3.他の容器に入れ替えないで下さい(誤用の原因になったり品質が変わることがあります)。4.容器内に乾燥剤が入っています。誤って服用しないで下さい。5.使用期限を過ぎた商品、使用前に開封された形跡のある商品は服用しないで下さい。6.小児の手の届かない所に保管して下さい。7.容器内の詰め物は、輸送中の製剤破損防止用です。開栓後はお捨て下さい。

使用期限、製造番号 缶底に記載

販売

日本臓器製薬株式会社

大阪府中央区平野町2丁目1番2号

お客様相談窓口 ☎06-6222-0441

土・日・祝日を除く 9:00~17:00

製造販売元

大木製薬株式会社

東京都千代田区神田鍛冶町3-3

副作用被害救済制度

☎0120-149-931

®登録商標

0302