

お試し  
サイズ

YOKUININ is for the treatment  
of rough skin.

水なしで飲める  
チュアブル錠

Kracie

肌  
あ  
れ  
に  
に  
き  
び  
に  
く  
り  
か  
え  
す

ハトムギ専科

ビタミンBCプラス  
ヨクイニン  
タブレット

ビタミンB2B6主薬製剤

Vitamin  
B2

Vitamin  
B6

Vitamin  
C

42錠 (7日分)

〈販売名〉  
ヨクイノーゲンBC錠 第3類医薬品



ビタミンB2B6主薬製剤

※切り取り線

吸湿しやすいため、服用のつどチャックをしっかりとしめること

この説明文は、本剤とともに保管し、服用の際には、よくお読みください。

販売名:ヨクイノーゲンBC錠

第3類医薬品

チャック

△使用上の注意

相談すること

- 1.服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
- 2.服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
- 3.1ヵ月位服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

【効能】 次の諸症状の緩和:肌あれ、にきび、口内炎、湿疹、皮膚炎、口角炎、口唇炎、舌炎、かぶれ、ただれ  
【ただし、これらの症状について、1ヵ月ほど使用しても改善がみられない場合は、医師又は薬剤師に相談してください。】

次の場合のビタミンB2B6の補給:肉体疲労時、妊娠・授乳期、病中病後の体力低下時  
【用法・用量】 1日3回食後、口の中で溶かすか、またはかみくだいて服用。

年齢	1回量	1日服用回数
成人(15才以上)	2錠	3回
15才未満7才以上	1錠	
7才未満	服用しないこと	

〈用法・用量に関連する注意〉

小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。

【成分】 成人1日の服用量6錠(1錠350mg)中

リボフラビン酪酸エステル(ビタミンB2酪酸エステル).....20mg  
 ピリドキシン塩酸塩(ビタミンB6).....100mg  
 アスコルビン酸(ビタミンC).....300mg  
 ヨクイニンエキス〔ヨクイニン7gに相当〕.....540mg  
 添加物として、アスパルテーム(L-フェニルアラニン化合物)、エリスリトール、CMC-Ca、ケイ酸Al、ステアリン酸Mg、香料、セルロースを含有する。

〈成分に関連する注意〉

- (1) 本剤に含まれるリボフラビン酪酸エステルにより、尿が黄色くなる場合があります。
- (2) 本剤は天然物(ヨクイニン)のエキスを用いていますので、錠剤の色が多少異なる場合があります。また、錠剤の表面に赤色の小さな斑点がみられる場合がありますが、これはリボフラビン酪酸エステルによるものです。

【保管及び取扱い上の注意】

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に、チャックをしっかりとしめて保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。
- (4) 使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。
- (5) 水分が錠剤につきまると、変色または色むらを生じることがありますので、誤って水滴を落としたり、ぬれた手で触れないでください。
- (6) パウチ内の乾燥剤はすてないでください。

発売元 クラシエ 薬品株式会社

東京都港区海岸3-20-20(〒108-8080)

ホームページ www.kracie.co.jp

お客様相談窓口 ☎(03) 5446-3334

受付時間10:00~17:00(土、日、祝日を除く)

製造販売元 クラシエ株式会社

東京都港区海岸3-20-20(〒108-8080)

製造

番号

使用

期限

1

H04-S

PE、金属

00888

