

第3類
医薬品

服用に際して、この説明文書を必ずお読みください。
また、必要な時読めるよう大切に保管してください。



ビハクは…

ビタミンB₂B₆主薬製剤
口内炎、皮膚炎、唇の両端のひび割れに

ビハク®

ビタミンB₂、活性型ビタミンB₆、
ヨクイニン配合

- 口内炎、皮膚炎、唇の両端のひび割れに効果をあらわすビタミンB₂、活性型ビタミンB₆と生薬ヨクイニン（ハトムギの種子）エキスを配合しています。
- ビタミンB₂・B₆は皮脂の分泌を抑え、にきびに効果をあらわします。
- オレンジ色の糖衣錠です。

⚠ 使用上の注意



相談すること

1. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性がありますので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください

関係部位	症 状
消化器	吐き気・嘔吐、食欲不振、腹部膨満感



2. 1ヵ月位服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください

[効 能]

- 次の諸症状の緩和：
口角炎（唇の両端の腫れ・ひび割れ）、口唇炎（唇の腫れ・ひび割れ）、口内炎、舌の炎症、湿疹、皮膚炎、かぶれ、ただれ、にきび・吹き出物、肌あれ
「ただし、これらの症状について、1ヵ月ほど使用しても改善がみられない場合は、医師又は薬剤師に相談すること。」
- 次の場合のビタミン B₂B₆ の補給：
肉体疲労時、妊娠・授乳期、病中病後の体力低下時

[用法・用量]

年 齢	1回服用量	1日服用回数
大人（15歳以上）	1～2錠	1回
7～14歳	1錠	
7歳未満	服用しないでください	

<用法・用量に関連する注意>

- (1) 定められた用法・用量を厳守してください。
- (2) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。

[成分・分量と働き]2錠中

成分	分量	働き
ビタミンB ₂ (リボフラビン)	30mg	皮脂の分泌を抑え、にきびに効果をあらわします。また、口中の粘膜に働き、口内炎に効果をあらわします。
ピリドキサルリン酸 エステル水和物 (活性型ビタミンB ₆)	20mg	ビタミンB ₂ と働きあって、皮膚の新陳代謝を活発にし、皮膚炎などのお肌のトラブルや口内炎に効果をあらわします。
ニコチン酸アミド	30mg	ビタミンB群の一種で皮膚粘膜の健康に役立ちます。
ピオチン	30μg	
ヨクイニン乾燥エキス	184.6mg (ヨクイニンとして2,400mg)	肌あれに効果をあらわします。

添加物として、CMC、乳糖、パレイショデンプン、ヒドロキシプロピルセルロース、ステアリン酸 Mg、ヒプロメロース、マクロゴール、炭酸 Ca、タルク、酸化チタン、白糖、ポリビニルアルコール（部分けん化物）、ポビドン、シメチルポリシロキサン、二酸化ケイ素、黄色5号、カルナウバロウを含有します。

〈成分・分量に関連する注意〉

本剤はビタミンB₂を含有するため、本剤の服用により、尿が黄色になることがあります。

◎保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。
(誤用の原因になったり品質が変わるおそれがあります。)
- (4) 使用期限をすぎた製品は、服用しないでください。



ビタミンの知識

ビタミンは食品から摂取しなければならない大切な栄養素です。ビタミンB₂・B₆の不足は、乳製品、肉類、豆類などの食品を十分に摂らなかつたり、飲酒、かぜなどによる発熱、抗生物質の服用などにより体内のビタミンB₂・B₆がたくさん消費されるために起こります。健康は正しい食生活から生まれます。好き嫌いをなくし、栄養バランスのよい食事を心がけることが大切です。

副作用被害救済制度のお問い合わせ先

(独) 医薬品医療機器総合機構

http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai_camp/index.html

電話 0120-149-931(フリーダイヤル)

本製品についてのお問い合わせは、
お買い求めのお店又は下記にお問い合わせください。
佐藤製薬株式会社 お客様相談窓口
電話 **03-5412-7393**
受付時間 9:00~17:00(土、日、祝日を除く)

製造販売元
佐藤製薬株式会社
東京都港区元赤坂1丁目5番27号