

使用前にこの説明文書を必ずお読み下さい。
また、必要な時に読めるよう大切に保管して下さい。

第3類医薬品

肌あれ、にきび、口内炎
疲れたときのビタミンB₂・B₆の補給に

エバユース[®]BBプラスC

ビタミンB₂B₆主薬製剤

エバユースBBプラスCの特徴

エバユースBBプラスCはビタミンB₂・B₆・C等のビタミン類に加えアミノ酸や生薬成分を配合した肌あれ、にきび等のお肌のトラブルを改善し健康な素肌を保つビタミン剤です。

- 肌あれ、にきび等の症状を緩和するビタミン配合
皮膚や粘膜を正常に保つビタミンB₂・B₆やニコチン酸アミド、コラーゲンの生成を助けるはたらきのあるビタミンCを配合
- お肌の新陳代謝に関与するアミノ酸 L-システイン配合
- 肌あれに効果をあらわす生薬として使用されているヨクイニン(ハトムギ由来)のエキスを配合
- シュガーフリーのフィルムコート錠で7歳から服用できます。



使用上の注意



相談すること

1. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性がありますので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	吐き気・嘔吐、食欲不振、胃部不快感、胃部膨満感

2. 服用後、次の症状があらわれることがありますので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。

下痢

3. 1カ月位服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。

効能・効果

- 次の諸症状の緩和：肌あれ、にきび・吹き出物、口内炎、口角炎(唇の両端の腫れ・ひび割れ)、口唇炎(唇の腫れ・ひび割れ)、舌の炎症、皮膚炎、湿疹、かぶれ、ただれ
「ただし、これらの症状について、1カ月ほど使用しても改善がみられない場合は、医師又は薬剤師に相談して下さい」
- 次の場合のビタミンB₂B₆の補給：肉体疲労時、妊娠・授乳期、病中病後の体力低下時

用法・用量

次の量を水又はお湯で服用して下さい。

年齢	1回量	1日服用回数
成人(15歳以上)	2錠	1回
7歳以上15歳未満	1錠	
7歳未満	服用しないで下さい。	

〈用法・用量に関連する注意〉

- (1) 用法・用量を厳守して下さい。
- (2) 食前・食後にかかわらず、いつでも服用していただけます。
- (3) 7歳以上の小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させて下さい。

成分・分量

本剤は、淡赤色のフィルムコート錠で、2錠中に次の成分を含有しています。






成分	分量	はたらき
リボフラビン酪酸エステル (ビタミンB ₂ 酪酸エステル)	20mg	皮膚や粘膜に作用し、肌あれ、 にきびなどを改善します。 また、からだの代謝を助け、 エネルギーを生み出します。
ピリドキシン塩酸塩 (ビタミンB ₆)	100mg	
アスコルビン酸 (ビタミンC)	200mg	コラーゲンの生成を助けます。
ヨクイニンエキス	107.7mg (原生薬として1.4g)	からだの新陳代謝を促したり、 消炎作用をあらわします。
L-システイン	40mg	皮膚や粘膜に作用して健康 維持にはたります。
ニコチン酸アミド	30mg	

添加物:トウモロコシデンブン、部分アルファー化デンブン、無水ケイ酸、ヒドロキシプロピルセルロース、クロスポビドン、ステアリン酸Mg、ヒプロメロース、酸化チタン、タルク、クエン酸トリエチル、黄色5号、三二酸化鉄、カルナウバロウ

〈成分・分量に関連する注意〉

- (1) 本剤に配合されているビタミンB₂酪酸エステルにより、尿が黄色になることがあります。
- (2) 本剤の服用により、尿及び便の検査値に影響を与えることがあります。医師の検査を受ける場合は、ビタミンCを含有する製剤を服用していることを医師に知らせて下さい。

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管して下さい。
- (2) 小児の手の届かない所に保管して下さい。
- (3) 他の容器に入れ替えないで下さい。(誤用の原因になったり品質が変わります)
- (4) めれた手で取り扱わないで下さい。水分が錠剤につくと、表面が一部溶けて、変色又は色むらを生じることがあります。また、めれた錠剤をビンに戻すと他の錠剤にも影響を与えますので、戻さないで下さい。
- (5) ビンの中の詰め物は輸送中の錠剤破損防止用ですので、開封後は捨てて下さい。
- (6) ビンの中に乾燥剤を入れてありますので、薬を使い終わるまでは捨てないで下さい。また、間違えて服用しないよう注意して下さい。
- (7) 表示の使用期限を過ぎた製品は使用しないで下さい。

本品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店又は下記にお願い致します。

第一三共ヘルスケア株式会社 お客様相談室
〒103-8234 東京都中央区日本橋3-14-10
電話 0120-337-336
受付時間 9:00~17:00(土、日、祝日を除く)

02®登録商標



販売元
第一三共ヘルスケア株式会社
東京都中央区日本橋3-14-10

製造販売元
佐藤薬品工業株式会社
奈良県橿原市観音寺町9-2