

販売名:ハイゼリーBフレッシュ

[使用上の注意] 相談すること

1.服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

| 関係部位 | 症 状 |
|-------|------------|
| 皮 膚 | 発疹 |
| 消 化 器 | 胸やけ、吐き気、下痢 |

2.しばらく服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

[効能・効果] 滋養強壮、肉体疲労・栄養障害・食欲不振・病中病後・発熱性消耗性疾患・産前産後などの場合の栄養補給、虚弱体质

[用法・用量] 成人(15才以上)1回1瓶(100mL)を1日1回服用する。なお、15才未満は服用しないこと。

●用法・用量を守ること。

[成 分] 1瓶(100mL)中 コンドロイチン硫酸エステルナトリウム300mg、ローヤルゼリー200mg、ニンジン乾燥エキス90mg(ニンジン603mgに相当)、ジオウ乾燥エキス50mg(ジオウ250mgに相当)、イカリ草エキス20mg(イカリソウ200mgに相当)、クコシ流エキス200μL(クコシ200mgに相当)、カルニチン塩化物100mg、L-リシン塩酸塩25mg、ビタミンB₂リン酸エステル15mg、ビタミンB₆5mg、ニコチン酸アミド20mg、無水カフェイン50mg
添加物:エリスリトール、スクラロース、カラメル、

2 キロ
カロリー & ノンシュガー



第2類医薬品

安息香酸Na、ブチルパラベン、クエン酸、クエン酸Na、香料、L-メントール、プロピレングリコール、バニリン、エチルバニリン、グリセリン、トコフェロール、その他2成分 (アルコール1.0mL以下)

●本剤に配合されているビタミンB₂リン酸エステルにより、尿が黄色になることがあります。
〔保管及び取扱い上の注意〕 (1)直射日光の当たらない涼しい所に保管してください。
(2)小児の手のとどかない所に保管してください。(3)本剤はまれに混濁することがありますが、薬効には変わりありません。(4)使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。

副作用救済制度 ☎ 0120-149-931

〔製造販売元〕 東京都中央区日本橋小舟町10-11
ゼリア新薬工業株式会社
お客様相談室 ☎ 03-3661-2080

ハイゼリーはゼリア新薬工業(株)の登録商標です。J11N