

発熱・疲労時の
栄養補給に

パルスゾン
内服液 30mL×3本

第2類医薬品



発熱・疲労時の
栄養補給に

パルスゾン 内服液

第2類医薬品



カンゾウエキス
ニンジンエキス配合





第2類医薬品

発熱・疲労時の栄養補給に **パルスゾン** 内服液

発熱・疲労時の 栄養補給に

パルスゾン 内服液

第2類医薬品

副作用被害救済制度
☎ 0120-149-931

使用期限

製造番号

⚠ 使用上の注意

相談すること

- 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。
 - 医師の治療を受けている人。
 - 高齢者。
 - 次の症状のある人。
むくみ
 - 次の診断を受けた人。
心臓病、高血圧、腎臓病

- 服用後、まれに下記の重篤な症状が起こることがある。その場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この製品を持って医師の診療を受けること。

症状の名称	症 状
偽アルドステロン症、ミオパチー	手足のだるさ、しびれ、つっぱり感やこわばりに加えて、脱力感、筋肉痛があらわれ、徐々に強くなる。

- 5～6日間服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。
- 長期連用する場合には、医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。

〈効能・効果〉

滋養強壮、虚弱体質、肉体疲労・病中病後・胃腸障害・栄養障害・発熱性消耗性疾患・妊娠授乳期などの場合の栄養補給

〈用法・用量〉

成人（15歳以上）1回1本（30mL）を1日3回服用する。

〈成分・分量〉

1日量（30mL×3本）中

リボフラビン …………… 6mg
 ビリドキシン塩酸塩 …………… 30mg
 タウリン …………… 2100mg
 ニンジンエキス（原生薬として999mg） …… 90mg
 カンゾウエキス（原生薬として5000mg） 1666.5mg
 添加物としてブドウ糖果糖液糖、白糖、D-ソルビトール、クエン酸、クエン酸Na、安息香酸Na、バラベン、プロピレングリコール、ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油、カラメル、香料を含有。

〈保管及び取扱い上の注意〉

- 直射日光の当たらない涼しい所に保管してください。
- 小児の手の届かない所に保管してください。
- 使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。
- 生薬成分を配合しているため、まれに沈殿又は浮遊を生じることがありますが、薬効には影響ありません。よく振ってから服用してください。

発 売 元 **協和薬品工業株式会社**

営業本部：岐阜県岐阜市野一色2丁目8番6号
問い合わせ先 ☎ 0120-468771

製造販売元 **萬金薬品工業株式会社**

奈良県高市郡明日香村野口317