

ご使用に際して、この説明文書を必ずお読み下さい。
また、必要な時に読めるよう大切に保管して下さい。

ビタミンB₂主薬製剤 **第3類医薬品**

ビタアルト®BB II

ビタアルトBB IIは、バランス良く配合された5種類のビタミンB群にヨクイニンエキス(ハトムギエキス)を加えました。

毎日の疲れをケアし、肌あれ・にきび・口内炎にも効果があるビタミン剤です。

⚠ 使用上の注意

相談すること



1. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性がある
ので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又
は登録販売者に相談して下さい

関係部位	症 状
消化器	胃部不快感、胃部膨満感、食欲不振、 吐き気・嘔吐

2. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症
状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、医師、
薬剤師又は登録販売者に相談して下さい

下痢

3. 1ヵ月位服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、
この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下
さい

成分・分量

1日量(2錠)中に、次の成分を含有します。

成 分	分量
リボフラビンリン酸エステルナトリウム (ビタミンB ₂ リン酸エステル)	38.1mg
ピリドキシン塩酸塩 (ビタミンB ₆)	50mg
チアミン硝酸塩 (ビタミンB ₁ 硝酸塩)	20mg
ニコチン酸アミド	40mg
パントテン酸カルシウム	20mg
ヨクイニンエキス (原生薬換算量)	100mg (1,300mg)

添加物として、乳酸Ca、ヒドロキシプロピルセルロース、カルメロースCa、乳糖、セルロース、リン酸水素Ca、トウモロコシデンプン、ステアリン酸Mg、ヒプロメロース、マクロゴール、炭酸Ca、タルク、アラビアゴム、ゼラチン、白糖、酸化チタン、黄色4号、黄色5号、カルナウバロウを含有します。

〈成分・分量に関連する注意〉

本剤の服用により、尿が黄色くなることありますが、これは本剤中のリボフラビンリン酸エステルナトリウムによるもので心配ありません。

効能・効果

次の諸症状の緩和:

口角炎、口唇炎、口内炎、舌炎、湿疹、皮膚炎、かぶれ、ただれ、にきび、
肌あれ、赤鼻、目の充血、目のかゆみ

「ただし、これらの症状について、1ヵ月ほど使用しても改善がみ
られない場合は、医師又は薬剤師に相談して下さい。」

次の場合のビタミンB₂の補給:

肉体疲労時、妊娠・授乳期、病中病後の体力低下時

用法・用量

次の量を朝夕食後に水又はお湯で服用して下さい。

年齢	1回量	1日服用回数
成人(15歳以上)	1錠	2回
15歳未満	服用しないこと	

〈用法・用量に関連する注意〉

用法・用量を厳守して下さい。

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管して下さい。
- (2) 小児の手の届かない所に保管して下さい。
- (3) 他の容器に入れ替えないで下さい。
(誤用の原因になったり品質が変わることがあります。)
- (4) 湿気により錠剤の外観が変化するおそれがありますので、ぬれた手で触れないで下さい。
- (5) びんの中の詰め物は、輸送中に錠剤が破損するのを防ぐためのものです。開封後は不要となりますので取り除いて下さい。
- (6) びんの中の「紙包み」は乾燥剤です。取り出したり、開けたり、食べたりしないで下さい。
- (7) 箱の内蓋の「開封年月日」欄に、開封日を記入して下さい。
- (8) 使用期限を過ぎた製品は服用しないで下さい。なお、使用期限内であっても、開封後は品質保持のため、6ヵ月以内に服用して下さい。

本剤について、何かお気づきの点がございましたら、お買い求めのお店又は下記までご連絡いただきますようお願い申し上げます。

消費者相談窓口：協和薬品工業株式会社 お客様相談室

☎ 0120-468771

受付時間 9:00～12:00・13:00～17:00(土、日、祝日を除く)

発売元 **協和薬品工業株式会社**

営業本部：岐阜県岐阜市野一色2丁目8番6号

製造販売元 **渡辺薬品工業株式会社**

富山県富山市水橋町555番地