

EC

天然型ビタミンE300mg

1日量

ビタミンC2000mg

B₂ B₆

テルクスEC顆粒ハイ

しみ そばかす 肩こり 手足の冷え

シュガーフリー / ナトリウムフリー

第3類医薬品

服用前にこの説明書きを必ずお読み下さい。
また、大切に保管して下さい。

使用上の注意

ここを押して開ける

⊗【してはいけないこと】

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)

次の人は服用しないで下さい：フェニルケトン尿症の人

■【相談すること】

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい

- (1)医師の治療を受けている人
- (2)薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人

2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この商品(箱)を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消 化 器	吐き気・嘔吐、胃部不快感

3. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この商品(箱)を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい：便秘、下痢

4. 1ヵ月位服用しても症状がよくなりえない場合は服用を中止し、この商品(箱)を持って医師、歯科医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい

5. 服用後、生理が予定より早くきたり、経血量がやや多くなったりすることがあります。出血が長く続く場合は、医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい

【効能効果】

○末梢血行障害による次の諸症状の緩和：肩・首すじのこり、手足のしびれ・冷え、しもやけ

○次の諸症状の緩和：しみ、そばかす、日やけ・かぶれによる色素沈着

○次の場合の出血予防：歯ぐきからの出血、鼻出血

「ただし、これらの症状について、1ヵ月ほど使用しても改善がみられない場合は、医師、薬剤師又は歯科医師に相談して下さい。」

○次の場合のビタミンECの補給：肉体疲労時、病中病後の体力低下時、老年期

【保管及び取扱い上の注意】

- (1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管して下さい。(2)小児の手の届かない所に保管して下さい。(3)他の容器に入れ替えないで下さい。(誤用の原因になったり品質が変わります。)
- (4)1包を分割した残りを服用する場合には、袋の口を折り返して保管し、2日以内に服用して下さい。
- (5)表示の期限内に服用して下さい。

第3類医薬品



テルクスEC顆粒ハイ (1包1.8g)

【成分分量】 3包(成人1日量)中

酢酸d-α-トコフェロール(天然型ビタミンE)..... 300mg
アスコルビン酸(ビタミンC)..... 2000mg
リボフラビン酪酸エステル(ビタミンB2)..... 12mg
ピリドキシン塩酸塩(ビタミンB6)..... 50mg
ニコチン酸..... 12mg
添加物としてアスパルテーム(L-フェニルアラニン化合物)、
エリスリトール、乳糖、酸化チタン、トウモロコシデンプン、
ヒドロキシプロピルセルロース、香料、ビタミンEを含有します。

<成分分量に関連する注意>

- (1)本剤の服用により、尿及び大便の検査値に影響を与えることがあります。尿及び大便の検査を受ける場合は、ビタミンCを含有する製剤を服用していることを医師にお知らせ下さい。
- (2)配合成分のリボフラビン酪酸エステルにより、尿が黄色になることがあります。

【用法用量】

成人(15才以上)..... 1回 1包
11才以上15才未満..... 1回 2/3包
7才以上11才未満..... 1回 1/2包
3才以上 7才未満..... 1回 1/3包
1才以上 3才未満..... 1回 1/4包
1日3回、4時間以上の間隔をおいて服用して下さい。

<用法用量に関連する注意>

- (1)用法用量を厳守して下さい。(2)小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させて下さい。

■お問い合わせ先

滋賀県製薬株式会社 <すり相談室>
電 話：(0748)88-3180(大代表)
受付時間：9時から17時まで
(土、日、祝日を除く)

製造販売元

滋賀県製薬株式会社
滋賀県甲賀市甲賀町滝879

登録商標

副作用救済制度 ☎ 0120-149-931

日本製