

しみ・そばかす・手足の冷え・肩こりに
ハイビタン® EC顆粒ハイ



しみ・そばかす



手足の冷え



肩こり



使用上の注意

☒ 【してはいけないこと】

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)

次の人には服用しないで下さい：フェニルケトン尿症の人



【相談すること】

1. 次の人には服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい
 - (1)医師の治療を受けている人
 - (2)薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人
2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消 化 器	吐き気・嘔吐、胃部不快感

3. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい
便秘、下痢
4. 1ヶ月位服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この文書を持って医師、歯科医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい
5. 服用後、生理が予定より早くきたり、経血量がやや多くなったりすることがあります。出血が長く続く場合は、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい

【効能効果】

- 末梢血行障害による次の諸症状の緩和：肩・首すじのこり、手足のしびれ・冷え、しもやけ
- 次の諸症状の緩和：しみ、そばかす、日やけ・かぶれによる色素沈着
- 次の場合の出血予防：歯ぐきからの出血、鼻出血
- 「ただし、これらの症状について、1ヶ月ほど使用しても改善がみられない場合は、医師、薬剤師又は歯科医師に相談して下さい。」
- 次の場合のビタミンECの補給：肉体疲労時、病中病後の体力低下時、老年期

【用法用量】

次の量を1日3回、4時間以上の間隔をおいて服用して下さい。

年 齢	1回量	1日服用回数
成人(15才以上)	1包	3回
11才以上15才未満	2/3包	
7才以上11才未満	1/2包	
3才以上7才未満	1/3包	
1才以上3才未満	1/4包	
1才未満	服用しないこと	

<用法用量に関連する注意>

- (1)用法用量を厳守して下さい。
- (2)小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させて下さい。

【成分分量】 3包(成人1日量) 中

酢酸d- α -トコフェロール(天然型ビタミンE)	300mg
アスコルビン酸(ビタミンC)	2000mg
リボフラビン酪酸エステル(ビタミンB2)	12mg
ピリドキシン塩酸塩(ビタミンB6)	50mg
ニコチン酸	12mg
添加物としてアスパルテーム(L-フェニルアラニン化合物)、エリスリトール、乳糖、酸化チタン、トウモロコシデンプン、ヒドロキシプロピルセルロース、香料、ビタミンEを含有します。	

<成分分量に関連する注意>

- (1)本剤の服用により、尿及び大便の検査値に影響を与えることがあります。尿及び大便の検査を受ける場合は、ビタミンCを含有する製剤を服用していることを医師にお知らせ下さい。
- (2)配合成分のリボフラビン酪酸エステルにより、尿が黄色になることがあります。

【保管及び取扱い上の注意】

- (1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管して下さい。
- (2)小児の手の届かない所に保管して下さい。
- (3)他の容器に入れ替えないで下さい。(誤用の原因になったり品質が変わります。)
- (4)1包を分割した残りを服用する場合には、袋の口を折り返して保管し、2日以内に服用して下さい。
- (5)表示の期限内に服用して下さい。

■お問い合わせ先

滋賀県製薬株式会社 くすり相談室
電話:(0748) 88-3180(大代表)
受付時間:9時から17時まで(土、日、祝日を除く)

製造販売元

滋賀県製薬株式会社

滋賀県甲賀市甲賀町滝879