



しみ、そばかす
日やけ・かぶれによる色素沈着に

アポステイー® EC+B

ビタミンEC主薬製剤

〔特 徴〕

- アポステイー EC+Bは、天然型ビタミンE、ビタミンCにB-Mixia（ビタミンB₂・B₆ + ニコチン酸アミド）を配合した、ビタミンEC主薬製剤です。
- お肌のメラニン色素（しみ・そばかすの原因）にはたらきかけてメラニンが作られるのを防ぎながら、お肌の新陳代謝を高めて、気になるしみや日やけ・かぶれによる色素沈着を緩和します。
- 噛んで効くゼリータイプのソフト錠です。

⚠ 使用上の注意

相談すること



1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
(1)医師の治療を受けている人。
(2)薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	吐き気・嘔吐、胃部不快感、胃部膨満感、食欲不振
3. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
便秘、下痢
4. 1ヵ月位服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この文書を持って医師、歯科医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
5. 服用後、生理が予定より早くきたり、経血量がやや多くなったりすることがあります。出血が長く続く場合は、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

〔効能・効果〕

- 次の諸症状の緩和：しみ、そばかす、日やけ・かぶれによる色素沈着
 - 末梢血行障害による次の諸症状の緩和：肩・首すじのこり、手足のしびれ・冷え、しもやけ
 - 次の場合の出血予防：歯ぐきからの出血、鼻出血
- 「ただし、これらの症状について、1ヵ月ほど使用しても改善がみられない場合は、医師、薬剤師又は歯科医師に相談すること。」
- 次の場合のビタミンECの補給：肉体疲労時、病中病後の体力低下時、老年期

〔用法・用量〕

年 齢	1回量	用 法
成人(15才以上)	2錠	1日1～3回かんで服用してください。 ただし、1日2回服用する場合は朝夕、1日3回服用する場合は朝昼晩服用してください。
15才未満		服用しないでください。

〈用法・用量に関連する注意〉

- (1)定められた用法・用量を守ってください。
- (2)必ずかんで服用してください。

(必ず裏面もお読みください)

〔成分〕成人1日最大服用量（6錠）中

アスコルビン酸（ビタミンC）	500mg
酢酸d-α-トコフェロール（天然型ビタミンE）	300mg
ビタミンB ₂ 酪酸エステル	10mg
ビタミンB ₆	50mg
ニコチン酸アミド	50mg

添加物：ポリソルベート80，カンテン末，白糖，水アメ，ペクチン，プロピレングリコール，アラビアゴム末，還元麦芽糖水アメ，β-カロテン

〈成分・分量に関連する注意〉

- (1)本剤の服用により，尿及び大便の検査値に影響をおよぼすことがあります。尿及び大便の検査を受ける場合には，本剤（ビタミンCを含有する製剤）を服用していることを医師にお知らせください。
- (2)本剤の服用により，尿が黄色になることがあります，これは成分のビタミンB₂酪酸エステルによるものです，ご心配ありません。
- (3)本剤は着色剤としてβ-カロテンを用いていますので，錠剤の色が多少異なることがあります。

〔保管及び取扱い上の注意〕

- (1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2)小児の手のとどかない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れかえないでください。（誤用の原因になったり品質が変わることがあります。）
- (4)品質保持のため，瓶の中の乾燥剤は取り除かないでください。また，間違えて服用しないように注意してください。
- (5)使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。



本品についてのお問い合わせは，お買い求めのお店又は下記に
お願い申し上げます。

ゼリア新薬工業株式会社 お客様相談室 電話 03-3661-2080
〒103-8351 東京都中央区日本橋小舟町10-11
受付時間 9:00～17:50（土・日・祝日を除く）

ホームページ <http://www.zeria.co.jp>

副作用被害救済制度のお問い合わせ先

(独)医薬品医療機器総合機構 <http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai.html>
電話 0120-149-931（フリーダイヤル）

アポスティーはゼリア新薬工業株式会社の登録商標です。



製造販売元

ゼリア新薬工業株式会社

東京都中央区日本橋小舟町10-11