

この説明文書はお薬とともに保管し、服用の際にはよくお読みください。

# 天然型ビタミンE・ビタミンC・B<sub>2</sub>・B<sub>6</sub> 配合 ピラピタンEC-S

第3類医薬品 ビタミンEC主薬製剤

ピラピタンEC-Sは天然型ビタミンE、ビタミンC、持続型ビタミンB<sub>2</sub>及びビタミンB<sub>6</sub>を配合した製剤です。

ビタミンEは血行をよくするビタミンとしてよく知られており、動脈硬化の原因となる過酸化脂質の生成を防ぎ、また、ホルモンのバランスの乱れを調整する大切なビタミンです。

本剤はこのビタミンEに更にビタミンC、ビタミンB<sub>2</sub>及びビタミンB<sub>6</sub>を配合した、芳香と酸味のある、服用しやすい顆粒剤です。



## 使用上の注意

### 相談すること



1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください  
(1)医師の治療を受けている人。  
(2)薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	吐き気・嘔吐、胃部不快感

3. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください  
便秘、下痢
4. 1ヵ月位服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この説明文書を持って医師、歯科医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
5. 服用後、生理が予定より早くきたり、経血量がやや多くなったりすることがあります。出血が長く続く場合は、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

### ■効能・効果

- 末梢血行障害による次の諸症状の緩和：肩・首すじのこり、手足のしびれ・冷え、しもやけ
  - 次の諸症状の緩和：しみ、そばかす、日やけ・かぶれによる色素沈着
  - 次の場合の出血予防：歯ぐきからの出血、鼻出血
- 「ただし、これらの症状について、1ヵ月ほど使用しても改善がみられない場合は、医師、薬剤師又は歯科医師に相談してください。」
- 次の場合のビタミンECの補給：肉体疲労時、病中病後の体力低下時、老年期
- (必ず裏面もお読みください)

## ■用法・用量

年 齢	1 回量	1 日服用回数
成人（15歳以上）	1 包	1～3回 〔なお、2回の場合は、朝夕、 3回の場合は朝昼晩に服用 してください。〕
11歳以上15歳未満	2/3包	
7歳以上11歳未満	1/2包	
3歳以上7歳未満	1/3包	
3歳未満	服用しないでください。	

### 〈用法・用量に関連する注意〉

小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。

## ■成分・分量

1日量（3包）中

（1包量:2200mg）

成 分	分 量	は た ら き
酢酸d- $\alpha$ -トコフェロール(天然型ビタミンE)	300mg	末梢血管の血行をよくします。
アスコルビン酸（ビタミンC）	2000mg	色素沈着を防ぎます。
リボフラビン酪酸エステル（ビタミンB <sub>2</sub> ）	12mg	肌を健康に保ちます。
ピリドキシン塩酸塩（ビタミンB <sub>6</sub> ）	50mg	

添加物：デキストリン、アルファー化デンプン、白糖、ショ糖脂肪酸エステル、ヒドロキシプロピルセルロース、グリチルリチン酸2K、香料、デンプン、デンプン部分加水分解物

### 〈成分に関連する注意〉

本剤の服用により尿が黄色くなることがあります。ビタミンB<sub>2</sub>によるものから心配ありません。

## ■保管及び取扱い上の注意

- (1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2)小児の手の届かない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れ替えないでください(誤用の原因になったり品質が変わります。)
- (4)1包を分割した残りを服用する場合には、袋の口を折り返して保管し、2日以内に服用してください。
- (5)配置期限を過ぎた製品は服用しないでください。

本品についてのお問い合わせは、下記までご連絡いただきますようお願い申し上げます。  
東亜薬品株式会社 お客様くすり相談室 〒939-3542 富山県富山市水橋開発277番10  
電話：076-478-5580 受付時間：9:00～16:00（土、日、祝祭日を除く）