

第3類医薬品

天然型ビタミンE・ビタミンC・B<sub>2</sub> 配合

# キーレEC

## ■製品の特徴

- 末梢の血液循環を促進させます。  
末梢血管の血流を促進し、血行障害による症状（肩・首すじのこり、手足のしびれ・冷え、しもやけ）をやわらげます。
- 体内の過酸化脂質の増加を防ぎます。  
ビタミンEは、血管壁や血液中の過酸化脂質（変質した脂肪）の増加を防ぎ、体内脂肪を安定に保ちます。
- 血管壁を強くします。  
毛細血管を丈夫にし、歯ぐきからの出血や鼻出血を予防します。
- しみや日やけなどによる色素沈着を防ぎます。  
ビタミンCは、しみや日やけなどの色素の沈着を防ぐ働きがあります。
- 効力のすぐれた成分を配合しています。  
植物油より抽出、精製、安定化した天然型ビタミンE（酢酸d-α-トコフェロール）は体内での効力がすぐれています。ビタミンB<sub>2</sub>酪酸エステル（リボフラビン酪酸エステル）は、従来のビタミンB<sub>2</sub>（リボフラビン）より体内での持続性にすぐれており、また血中の脂質代謝にも関与しています。



## 使用上の注意

### 相談すること



1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい  
(1) 医師の治療を受けている人。  
(2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消 化 器	吐き気・嘔吐、胃部不快感、胃部膨満感、食欲不振

3. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい  
便秘、下痢
4. 1ヵ月位服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この文書を持って医師、歯科医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい
5. 服用後、生理が予定より早くきたり、経血量がやや多くなったりすることがあります。出血が長く続く場合は、医師、薬剤師、又は登録販売者に相談して下さい

## ■適応症

- 末梢血行障害による次の諸症状の緩和：肩・首すじのこり、手足のしびれ・冷え、しもやけ
- 次の諸症状の緩和：しみ、そばかす、日やけ・かぶれによる色素沈着
- 次の場合の出血予防：歯ぐきからの出血、鼻出血  
「ただし、これらの症状について、1ヵ月ほど使用しても改善がみられない場合は、医師、薬剤師又は歯科医師に相談すること。」
- 次の場合のビタミンECの補給：肉体疲労時、病中病後の体力低下時、老年期

## ■用法・用量

年 齢	1 回 量	1 日服用回数
成人(15才以上)	1 包	1～3回
11才以上15才未満	2 / 3 包	
7才以上11才未満	1 / 2 包	
7 才 未 満	服用しないこと。	

ただし、1日2回の場合は朝夕、3回の場合は朝昼晩に服用する。

### 〈用法・用量に関連する注意〉

小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させて下さい。

## ■成 分

3包(成人1日量)中、次の有効成分を含有します。

成 分	含 量
酢酸d-a-トコフェロール(天然型ビタミンE)	300mg
アスコルビン酸(ビタミンC)	2000mg
リボフラビン酪酸エステル(ビタミンB <sub>2</sub> 酪酸エステル)	12mg

添加物として粉末還元麦芽糖水アメ、白糖、デキストリン、エリスリトール、第三リン酸カルシウム、プルラン、アスパルテーム(L-フェニルアラニン化合物)、酒石酸、ビタミンE、香料を含有します。

### 〈成分に関連する注意〉

- (1) 本剤の服用により、尿及び大便の検査値に影響を与えることがあります。医師の治療を受ける場合は、本剤を服用していることを医師に知らせて下さい。
- (2) 本剤に配合されているリボフラビン酪酸エステルにより、尿が黄色になることがあります。

## ■保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管して下さい。
- (2) 小児の手の届かない所に保管して下さい。
- (3) 他の容器に入れ替えないで下さい。(誤用の原因になったり品質が変わる。)
- (4) 使用期限を過ぎた製品は服用しないで下さい。なお、使用期限内であっても、なるべく早く服用して下さい。(品質保持のため。)
- (5) 1包を分割した残りを服用する場合には、袋の口を折り返して保管し、2日以内に服用して下さい。
- (6) 箱の開封年月日記入欄に、開封日を記入して下さい。

## ■包装単位 90包(1包2g入り)

## ■お問い合わせ先

備前化成株式会社 お客様相談窓口

電 話 0120-330-476(フリーダイヤル)

受付時間 9:00～17:00(土日祝祭日を除く)

## 副作用被害救済制度のお問い合わせ先

☎0120-149-931

製造販売元



備前化成株式会社

BIZEN 岡山県赤磐市徳富363

VER 002