

第3類医薬品

ビタミンE&C製剤

ズバロン[®]

ズバロンは天然型ビタミンEとビタミンCを配合した中身が溶けやすい液状のソフトカプセルです。

⚠ 使用上の注意



相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
 - (1) 医師の治療を受けている人。
 - (2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるため、直ちに服用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消 化 器	吐き気・嘔吐、胃部不快感

3. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
便秘、下痢
4. 1ヶ月位服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この説明書を持って医師、歯科医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
5. 服用後、生理が予定より早くきたり、経血量がやや多くなったりすることがあります。出血が長く続く場合は、医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

効能・効果

末梢血行障害による次の諸症状の緩和	肩・首すじのこり、手足のしびれ・冷え、しもやけ
次の諸症状の緩和	しみ、そばかす、日やけ・かぶれによる色素沈着
次の場合の出血予防	歯ぐきからの出血、鼻出血
ただし、これらの症状について、1ヶ月ほど使用しても改善が見られない場合は、医師、薬剤師又は歯科医師に相談してください。	
次の場合のビタミンECの補給	肉体疲労時、病中病後の体力低下時、老年期

※裏面も必ずお読みください。

用法・用量

年齢	1日量
15歳以上	2カプセルを1~3回
11歳以上15歳未満	1カプセルを2~3回
7歳以上11歳未満	1カプセルを1~3回
7歳未満	服用しないこと

ただし、1日2回服用する場合は朝夕、1日3回服用する場合は朝昼晩服用してください。

[用法・用量に関する注意]

- (1) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。
- (2) 定められた用法・用量を守ってください。

1日量(6カプセル)中

成分・分量

成 分	分 量	は た ら き
d-α-トコフェロール酢酸エステル (天然型ビタミンE)	300mg	不飽和脂肪酸が酸化して有害物質になるのを防ぐとともに、脂肪の代謝及び末梢血管の拡張に有効です。
アスコルビン酸	600mg	細胞と細胞をつなぐ結合組織の主成分コラーゲンの生成を助け、毛細血管を丈夫にしたり、皮膚のメラニン色素に働き、しみなどの色素沈着を緩和する働きがあります。

添加物として、サラシミツロウ、サフラン油、ゼラチン、コハク化ゼラチン、グリセリン、エチルパラベン、プロピルパラベン、ポリソルベート80、酸化チタン、赤色102号、青色1号を含有。

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変ってしまいます)
- (4) 表示の使用期限を過ぎたものは服用しないでください。
- (5) 瓶から取り出すときに濡れた手で触らないようにご注意下さい。(品質が変わることになります) また開封後は服用のつど、しっかりフタを閉めて6ヶ月以内を目安に服用してください。

お問い合わせ先

中央薬品株式会社 お客様相談窓口
電話 076-493-5010
受付時間 9時~17時(土・日・祝日を除く)

製造販売元



中央薬品株式会社

富山県富山市西四十町4-9

副作用救済制度 ☎ 0120-149-931