

ビタミンE C 主薬製剤

天然型ビタミンE、C、B₂、B₆配合

リキフェロール

第3類医薬品

本剤は、油状の天然型ビタミンE(トコフェロール)のうち生理活性のすぐれたd- α 型のビタミンEを微小カプセル化した理研ドライE-B500d-GP、及び体の働きに大切なビタミンC、B₂、B₆を配合したビタミンE、Cを主薬としたカプセル製剤です。

作用・特長

1. ビタミンEは、末梢血液循環を促進し、血行をよくする作用があり、肩こり、手足のしびれ、冷えを感じる症状を緩和します。
2. ビタミンEは、老化をすすめる過酸化脂質の生成を抑える作用があり、血管壁を強くします。
3. ビタミンCは疲れやストレスの解消に役立ちます。
4. ビタミンCは、しみ、そばかす、日やけの色素沈着を緩和し、歯ぐきからの出血及び鼻出血を予防します。
5. ビタミンB₂・B₆は脂質代謝に関与し、ビタミンEとビタミンCの作用を助けます。



使用上の注意

相談すること



1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。
 - (1) 医師の治療を受けている人
 - (2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人
2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	吐き気・嘔吐、胃部不快感

3. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。
便秘、下痢
4. 1ヵ月位服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この文書を持って医師、歯科医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。
5. 服用後、生理が予定より早くきたり、経血量がやや多くなったりすることがあります。出血が長く続く場合は、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。

効能・効果

- 末梢血行障害による次の諸症状の緩和：肩・首すじのこり、手足のしびれ・冷え、しもやけ
- 次の諸症状の緩和：しみ、そばかす、日やけ・かぶれによる色素沈着
- 次の場合の出血予防：歯ぐきからの出血、鼻出血
「ただし、これらの症状について、1ヵ月ほど使用しても改善がみられない場合は、医師、薬剤師又は歯科医師に相談して下さい。」
- 次の場合のビタミンE Cの補給：肉体疲労時、病中病後の体力低下時、老年期

用法・用量

年齢	1回量	1日服用回数
15歳以上	1カプセル	2～3回
15歳未満	服用しないこと	

1日2回服用する場合は朝夕、1日3回服用する場合は朝昼晩服用して下さい。

〈用法・用量に関連する注意〉

用法・用量を守って下さい。

成分・分量 [1日量(3カプセル)中]

理研ドライE-B500d-GP (酢酸d- α -トコフェロール200mg) …………… 400mg
アスコルビン酸 (ビタミンC) …………… 200mg
リボフラビン酪酸エステル (ビタミンB₂酪酸エステル) …………… 10mg
ピリドキシン塩酸塩 (ビタミンB₆) …………… 20mg
添加物としてバレイシヨデンブ、乳糖水和物、タルク、ゼラチン、青色1号、ラウリル硫酸Na、グリセリン脂肪酸エステル、白糖、二酸化ケイ素、無水ケイ酸、ステアリン酸Mgを含有する。

〈成分に関連する注意〉

本剤の服用により、尿及び大便の検査値に影響を与えることがあります。医師の治療を受ける場合は、アスコルビン酸 (ビタミンC) を含有する製剤を服用していることを医師に知らせて下さい。

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管して下さい。
- (2) 小児の手の届かない所に保管して下さい。
- (3) 他の容器に入れ替えないで下さい。(誤用の原因になったり品質が変わります)
- (4) 表示の期限を過ぎた製品は服用しないで下さい。なお、表示の期限内であっても開封後は品質保持の点からなるべく早く服用して下さい。

お問い合わせ先

中新薬業株式会社 お客様相談室
電話 076(475)2121 内線57(開発部)
受付時間 9:00～16:00(土、日、祝日を除く)



製造販売元

中新薬業株式会社

富山県滑川市上小泉504-2